

REVUE

ET MAGASIN

DE ZOOLOGIE

PURE ET APPLIQUÉE.

RECUEIL MENSUEL

DESTINÉ A FACILITER AUX SAVANTS DE TOUS LES PAYS LES MOYENS DE
PUBLIER LEURS OBSERVATIONS DE ZOOLOGIE PURE ET APPLIQUÉE
A L'INDUSTRIE ET A L'AGRICULTURE, LEURS TRAVAUX DE
PALÉONTOLOGIE, D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE
COMPARÉES, ET A LES TENIR AU COURANT
DES NOUVELLES DÉCOUVERTES ET DES
PROGRÈS DE LA SCIENCE;

PAR

M. F. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE,

Membre de la Légion d'honneur, de l'ordre bésilien de la Rose, de la Société
impériale et centrale d'Agriculture, des Académies royales des Sciences
de Madrid et de Turin, de l'Académie royale d'Agriculture de Turin,
de la Société impériale des naturalistes de Moscou, d'un
grand nombre d'autres Sociétés nationales et étrangères,
Secrétaire du Conseil de la Société impériale
zoologique d'Acclimatation, etc., etc.

2^e SERIE. — T. XI. — 1859.

PARIS,

AU BUREAU DE LA REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE,

RUE DES BEAUX-ARTS, 4.



Aux espèces assez nombreuses à retrancher du genre *Carychium*, dont nous avons donné la liste (page 59 à 62), il faut intercaler (page 60, après la 14^e ligne) le Mollusque suivant :

Carychium Delocrei, *Michaud*, *Descript. Coq. foss. d'Hauterive*, page 19, pl. v, fig. 9, 1855, qui est une espèce fossile à rapporter au genre *AURICULA*.

Ici se terminent les observations et rectifications nouvelles que nous avons à faire connaître sur le genre *CARYCHIUM*.

DESCRIPTION de deux Coléoptères nouveaux d'Algérie; par
M. L. FAIRMAIRE.

Cleonus cristulatus. — L. 9 à 12 mill. — Ovatus, antice angustatus, fusco-nigrescens, squammis ocraceis griseo-variegatis indutus. Capite late impresso, rostro valde carinato; prothorace lateribus compresso, medio canaliculato, dorso fusco, lateribus albidis. Elytris breviter ovatis, lateribus crenatis dense pilosis, dorso utrinque bicarinatis, carinis transversim ter conjunctis pilisque nigris instructis.

Trouvé à Lalla-Maghrnia par M. Cotty, officier comptable.

Dromius vittula. — L. 4 mill. — Oblongus, subæneus, nitidus. Capite prothoraceque lævibus; hoc postice angustato, angulis posticis oblique truncatis; elytris leviter striatis, striis lateribus obsoletis; utrinque vitta angusta flavida, humero et ante apicem dilatata, medio interdum confusa; antennis pedibusque nigrescentibus.

Trouvé à Lalla-Maghrnia par M. Cotty.

ORTHOPTERA NOVA AMERICANA. (Diagnoses præliminaires.)
Auctore H. de SAUSSURE.

Fam. MANTIDÆ.

Gen. MANTIS, L. — Fœminarum elytra lata (id est area