


Т Р У Д Ы
РУССКАГО
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ВЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.



Н О Р А Е
SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE
ROSSICAE

VARIIS
SERMONIBUS IN ROSSIA USITATIS EDITAE.

ТОМЪ XXIX.

СЪ 3 ТАБЛИЦАМИ РИСУНКОВЪ И 6 ФИГУРАМИ ВЪ ТЕКСТЪ.

1894—1895.

ПОДЪ РЕДАКЦІЮ
А. П. СЕМЕНОВА.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1895.

Напечатано по распоряженію Русскаго Энтомологическаго Общества.
Декабрь 1895.

Редакторъ: *Андрей Семеновъ*.

887270
'29

ОГЛАВЛЕНИЕ. — INDEX.

Дѣйствія Общества. — Bulletin entomologique.

	СТРАН.
Извлеченіе изъ протоколовъ Общихъ Собраній за 1894 годъ. (Séances de la Société en 1894).....	III—XIX
Отчетъ Совѣта за 1894 годъ. (Compte-rendu du Bureau pour 1894).....	XX—XXX
Составъ Общества къ 1 Декабря 1894 года. (Liste des mem- bres de la Société en 1894)	XXXI—XXXVI
Перечень ученыхъ учрежденій, съ которыми Общество на- ходится въ сношеніяхъ и обмѣнивается издавіями. (Liste des institutions, avec lesquelles la Société fait des échanges).....	XXXVII—XLII

Матеріалы и изслѣдованія. — Matériaux scientifiques.

Beitrag zur Bienenfauna Turkmenies. Von Dr. F. Morawitz....	1— 76
Fragments braconologiques. I—III. Par N. Kokouyew.....	77— 95
Beiträge zur Kenntniss der Käfer des Europäischen und Asia- tischen Russlands mit Einschluss der Küsten der Kaspis- schen Meeres. Von J. Faust.....	96—107
Ein neuer <i>Lithobius</i> . Beschrieben von A. Trotzina.— Taf. I.....	108—110
Ueber Thelyphoniden aus den Sammlungen einiger russischen Museen. II. Von J. Tarnani. — Taf. I.....	111—121
Note sur les <i>Stenolophus morio</i> Mén. et <i>procerus</i> Schaum. Par T. Tschitschérine.....	122—124

Coleoptera asiatica nova. III. Descripsit Andreas Semenow.	125—144
Entomotomische Miscellen. I—II. Von Prof. Dr. N. Cholodkovsky. — Taf. II.	145—153
Supplément à la faune des Carabiques de la Corée. Par T. Tschitschérine.	154—188
Coleoptera asiatica nova. IV. Descripsit Andreas Semenow.	189—210
Contributions à la faune des Carabiques de la Russie. II—III. Par T. Tschitschérine.	211—241
Coleoptera nova Rossiae europaeae Caucasique. I. Descripsit Andreas Semenow.	242—250
Coleoptera asiatica nova. V. Descripsit Andreas Semenow.	251—270
Revisio generis <i>Xenomela</i> Weise. Auctore G. Jacobson.	271—281
Révision du sous-genre <i>Compsodorcadion</i> Ganglb. Par B. E. Jakowleff.	282—289
Lepidoptera palaeartica nova descripta a Gr. Grum-Grshimailo. III.	290—293
Corrigenda. Auctore G. Jacobson.	294—297
Description de deux nouvelles espèces du genre <i>Bembidium</i> Latr. Par T. Tschitschérine.	298—302
Coleoptera nova Rossiae europaeae Caucasique. II. Descripsit Andreas Semenow.	303—327
De speciebus ad gregem <i>Cymindis Faldermanni</i> Chaud. spectantibus. Scripsit Andreas Semenow.	328—335
Coleoptera asiatica nova. VI. Descripsit Andreas Semenow.	336—362
Fragments braconologiques. IV—V. Par N. Kokouyew.	363—392
De <i>Cicindela Schrenki</i> Gebl. ejusque cognatis. Scripsit Andreas Semenow.	393—406
Materialien zu einer Vespidenfauna des Russischen Reiches. Von Dr. F. Morawitz.	407—493
Description de quelques Carabiques nouveaux ou peu connus. Par T. Tschitschérine.	494—503
<i>Pulex lamellifer</i> n. sp. Von Jul. Wagner.	504—505
Description de quelques Longicornes paléarctiques nouveaux ou peu connus. Par B. E. Jakowleff.	506—514
De genere <i>Rhampholyssa</i> Krtz. Sscripsit Andreas Semenow.	515—519
Tria Coleoptera nova e Rossia europaea. Auctore G. Jacobson. — Tab. III.	520—524
Description d'une nouvelle espèce de la famille des Lucanides. Par B. E. Jakowleff.	525—528

BEITRÄGE

ZUR

**Kenntniss der Käfer des Europäischen und
Asiatischen Russlands mit Einschluss der
Küsten des Kaspischen Meeres.**

Von

J. Faust.

(6. Fortsetzung *).

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 60. <i>Dactylotus nitidulus</i> . | 67. <i>Dorytomus cephalotes</i> . |
| 61. <i>Phyllobius</i> (<i>Aprepes</i>) <i>Motschulskyi</i> . | 68. — <i>ruber</i> . |
| 62. <i>Phytonomus Eversmanni</i> . | 69. <i>Orchestes exiguus</i> . |
| 63. <i>Stephanocleonus labilis</i> . | 70. <i>Miarus Jakowlewi</i> . |
| 64. — <i>luctuosus</i> . | 71. <i>Centorrhynchus Herbsti</i> . |
| 65. — <i>leprosus</i> . | 72. — <i>Gyllenhali</i> . |
| 66. <i>Lixus irkutensis</i> . | 73. — <i>cupidus</i> . |
| 74. <i>Centorrhynchus sibiricus</i> . | |

Dactylotus nitidulus* nov. sp. *D. Roborowskyi* Fst. *simillimus*, sed *convexior*; *fronte rostroque angustioribus*; *prothorace elytrisque longitudinaliter convexioribus*, *his profunde striato-

*) Cf. *Horae Soc. Ent. Ross.*, XXV, 1891, p. 386.

punctatis, interstitiis convexis; oculis convexioribus; antennis tarsisque rufo-testaceis. — Long. 5, lat. 2,5 mm.

Kuku-noor. Von Herrn Koltze eingeschickt.

Bei *Roborowskyi* haben Thorax und Decken eine nicht unterbrochene, bei *nitidulus* hat jeder dieser Körpertheile seine eigene Längswölbung; ein ebenso auffallendes Unterscheidungsmerkmal zeigt die Deckensculptur, während die des Rüssels, des Kopfes und des Halsschildes bei beiden Arten gleich ist; bei jenem sind nämlich die Spatien ganz flach, die eingestochenen gereihten Punkte sehr klein und noch kleiner, bei der neuen Art viel größer als die auf dem Thorax, tief eingedrückt, in flach vertieften Streifen stehend und die Spatien sind gewölbt. Durch diese Deckensculptur unterscheidet sich *nitidulus* auch von allen bisher beschriebenen Arten.

Mehrere vorgelegte Stücke zeigen constant die hier angegebenen Merkmale. Vollständig ausgefärbte Stücke sind bis auf die gelben Fühler und die zwei letzten Tarsenglieder tief schwarz.

Aprepes Motschulskyi nov. sp. *Ovatus, niger, nitidus, squamis elongatis angustis viridibus pubeque cinerea parce obsitus; antennis pedibusque (femorum clava excepta) rufo-brunneis; prothorace cum capite rostroque confertim punctatis; fronte foveola parva impressa; oculis modice convexis; rostro brevi antrorsum parum angustato, medio sulcato; antennis subtiliter pubescentibus, articulo secundo funiculi primo longiore; prothorace transverso lateribus rotundato-ampliato, convexo, interdum linea media impunctata; elytris (♂) ellipticis vel (♀) post medium latioribus, apice acute rotundatis, convexis, humeris fere nullis, dense striato-punctatis; femoribus dentatis nonnihil clavatis, dorso apicem versus viridi-squamosis; abdomine cinereo-pubescente, pectore viridi-squamoso.* — Long. 5,2 — 7, lat. 2—2,8 mm.

Maltinskoje, 120 Werst westlich von Irkutsk. Von Herrn B. E. Jakowlew erhalten.

Mit *crassus* Motsch. und *crassior* Desbr. hat die neue Art das verlängerte zweite Geißelglied gemeinsam, unterscheidet

sich von ersterem durch dünnere Fühler, etwas kürzeren Rüssel und andere Färbung, von letzterem durch kürzeren Rüssel, etwas dickere Fühler, hinten weniger zugespitzte Decken und undichtere Beschuppung, von *gyratus* Gyll. durch hell gefärbte dickere Fühler und Beine, kürzeren Rüssel, gewölbteren Thorax, hinten weniger zugespitzte Decken und von den beiden letzten auch durch längere Schuppen.

Die Dicke des Fühlerschaftes hält die Mitte zwischen denen des *crassus* und *crassior*. Die Bekleidung besteht aus nicht dichten grünen, lang kommaförmigen, stellenweise haarförmigen Schuppen und eingemischten gelbgrauen anliegenden Härchen, die ebenso lang als die Schuppen sind. Die Punkte in den hin und wieder schwach vertieften Streifen stehen sehr dicht, die schmalen Stege zwischen ihnen greifen besonders beim schmälere Männchen auf die fein punktirtten Spatien über und ihnen entspringt ein von hinten eingestochenes kurzes anliegendes Härchen. Die Rückenante der Schienen ist viel weniger scharf als bei den drei übrigen Arten. Beim Weibchen sind Kopf, Rüssel, Thorax und die Decken hinter der Mitte breiter als beim Männchen und der Thorax hat seine grösste Breite etwas vor (beim Männchen in) der Mitte, und auch einen, dem Männchen fehlenden erhabenen Vorderrand.

Phytonomus Eversmanni nov. sp. ♀. *Oblongo-ovatus, nigro-brunneo-squamosus, roseo-albo-lineatus; antennis basi brunneis; rostro arcuato prothoracé brevior; fronte obsolete foveolata; prothorace paulo transverso medio maxima latitudine, intra apicem haud constricto, densissime punctato, roseo-albo-trilincato; scutello parvo albido; elytris convexis maxima latitudine post medium, apice obtuse rotundatis, obsoletissime punctato-striatis, interstitiis latis planis, 7^o, 8^o, 9^o cinereis, 2^o maxima ex parte, 3^o basi, 6^o margineque totis albidis, 8^o nigro-tessellato; corpore subtus cinereo-albido-squamoso; pedibus crassis.* — Long. 6, lat. 3 mm.

Orenburg.

Ein Stück dieser Art besitze ich seit langer Zeit aus der

Eversmann'schen Sammlung, hielt dasselbe aber, solange mir *Kunzei* Ahr. nicht in natura bekannt war, für eine Varietät des letzteren. Jetzt, im Besitz eines Pärchens dieser, wie es scheint, noch immer seltenen Art, erweist sich das Orenburger Stück von dieser nicht nur durch die Zeichnung, sondern auch durch die Körperform und den Rüssel als specifisch verschieden. Rüssel kaum so lang als der Thorax und ebenso dick als die Vorderschenkel. Der kürzere Thorax hat seine grösste Breite in der Mitte, ist seitlich hinter dem Vorderrande nicht eingeschnürt und oben dichter punktirt. Die Decken haben ihre grösste Breite weit hinter der Mitte, sind an der Spitze breit gerundet, die Streifen sowie die Punkte in ihnen viel feiner; das röthlich-weiße Spatium 2 ist vor der Basis abgebrochen und erreicht diese erst mit einer Erweiterung auf 3 (ähnlich wie bei *Rogenhoferi*), der übrige Theil von 3, sowie die ganzen Spatien 4 und 5 sind tief braun-schwarz, 6 und der Aussenrand ganz weiss, 7—9 gelbgrau, 8 schwarz gewürfelt. Fühlerschaft und Geissel kürzer, die Beine ebenso dick als bei *Kunzei*.

Stephanocleonus labilis. Unter diesem Namen habe ich Stücke von Amdo, Gan-ssu (Potanin) und vom Kuku-noor (Koltze) vereinigt, die mit meinem *Przewalskyi* leicht zu verwechseln, von ihm jedoch durch die Thoraxsculptur, die Decken- und Vorderschienenform wie folgt zu trennen sind.

Decken hinten stumpf gerundet; Thorax tief und dicht grubenartig punktirt, die Räume zwischen den Punkten gewundene Runzeln bildend; Rücken der Vorderschiene vor der Spitze lang geschweift, die Aussenecke als gerundeter Lappen vortretend.

Przewalskyi Fst.

Decken hinten spitzer gerundet; Thorax oberflächlich, fein und weniger dicht punktirt, die Räume zwischen den Punkten ohne Spur von Runzelbildung; Rücken der Vorderschiene gerade, die Aussenecke nicht vorspringend **labilis** nov. sp.

Stephanocleonus luctuosus nov. sp. *Ovatus, niger, opacus, supra squamulis minutissimis plumbeis obsitus et cinnamomeo-*

pulverulentus; rostro, *elytrorum* margine, *singulo* vitta abbreviata humerali, fascia obliqua ante apicem corporeque subtus albido-squamosis; rostro arcuato inter duas impressiones in frontem continuatas alte carinato; fronte foveolata; prothorace transverso, parallelo, intra apicem subito contracto, alutaceo, punctis sparsis sat grossis obsito, dorso antice carinato, postice obsolete lateque sulcato; *elytris* sulcatis, in sulcis remote punctatis, interstitiis convexis, alternis latioribus et elevatioribus; pedibus abdomineque remote nigro-irroratis, segmentis abdominalibus tribus medio minus dense squamosis. — Long. 11, lat. 5 mm.

Von Herrn Julius Wagner am See Schiro (Kreis Jenissejsk) entdeckt.

Diese hübsche Art gehört zur *thoracicus*-Gruppe, ist noch kürzer und hinten stumpfer gerundet als *compressicollis* Faldm. und von allen zu dieser Gruppe gehörigen Arten (*puncticollis* Fhrs., *fuscus* Fst., *Ehnbergi* Fst. und den beiden genannten) durch den scharfen Rüsselkiel und die Deckenzeichnung leicht zu unterscheiden. Eine humerale, bis etwa zur Höhe der Hinterhüften reichende Strichmakel auf den Spatien 5 und 6, eine nicht breite den Aussenrand erreichende, aber durch die Naht und Spatium 1 unterbrochene Querbinde dicht vor der stumpfen Schwiele sind wie die beiden äusseren Spatien, die Unterseite des Körpers und einzelne Flecke zwischen der Querbinde und Spitze mit weissen Haarschuppen dicht besetzt; der übrige Theil der Decken und der Thorax sind schwach reibeisenartig und dicht punktirt, in den Punkten mit einem seidenartig schimmernden Schuppenhärchen besetzt und zimmtfarbig bestäubt. Der gewölbte Scheitel ist in der Mitte citronengelb, hinter den Augen wie die Rüsselseiten zimmtfarbig; Stirne mit weitläufigen flachen Punkten besetzt und in den flachen, sich auf den Rüssel tiefer fortsetzenden Furchen kahl. Rüssel fast doppelt so lang als breit, oben dicht weisslich beschuppt; der Mittelkiel endigt in einer Grube zwischen den Fühlereinkenungen und in einer Stirngrube. Decken kaum um die Hälfte länger als breit, an der jeder-

seits abgestutzten oder leicht geschweiften, leicht aufgebogenen Basis deutlich breiter als die Thoraxbasis, die Aussenecken kurz gerundet, hinter diesen flach geschweift, dann gerundet-erweitert, mit der grössten Breite in der Mitte und hier um $\frac{1}{3}$ breiter als der Thorax, gleich hinter der Basis quer niedergedrückt, die flache Naht und das gewölbte Spatium 2 doppelt, 4 und 6 um die Hälfte breiter als die umliegenden. Beine dichter schwarz irrorirt als das Abdomen, die Schenkel wenig und nur nach unten verdickt. Prosternum vor den Hüften mit kleinem Höcker.

Stephanocleonus puncticollis var. **leprosus** hat Leder in Chan-hai (N. Mongolei) gesammelt; bei dieser Sculpturänderung sind die bei der Stammform ebenso abwechselnden Deckenspatien unterbrochen erhaben.

Lixus irkutensis nov. sp. *Elongatus, niger, cinereo-pubescens, brunneo-pollinosus; antennis basi rufescentibus; fronte foveolata haud impressa; rostro valido, cylindrico, prothorace brevior, basi carinulato; prothorace quadrato lateribus subparallelo, apice angustato, basi leviter bisinuato, confertim punctato; elytris prothorace haud latioribus, subcylindricis, postice rotundato-angustatis, basi obsolete transversim impressis, striato-punctatis; corpore subtus obsolete nigro-irrorato.* — Long. 6—6,5, lat. 1,7—1,9 mm.

Irkutsk (B. E. Jakowlew), Daurien (Eversmann).

Des kurzen und dicken Rüssels wegen mit *pyrrhocnemis* Boh. verwandt; von diesem durch die nicht eingedrückte Stirne, den parallelseitigen und hinter dem Vorderrande nicht eingeschnürten Thorax, sowie durch das an den Seiten nicht gelb gerandete Abdomen zu unterscheiden.

Kopf, Rüssel und Thorax mit doppelter, ziemlich dichter Punktirung. Rüssel etwas gebogen, doppelt so lang als dick. Thorax vor dem Schildchen leicht eingedrückt, die gröberen Punkte zum röthlichen, in der Mitte kaum gebuchteten Vorderande viel feiner werdend, die Augenlappen sehr flach gerundet und wenig vortretend. Decken kaum breiter als der Thorax und fast dreimal so lang als dieser, vom Spitzendrittel ab flach gerun-

det-verengt, jede stumpf zugespitzt (ähnlich wie bei *difficilis*). Beine denen von *brevipes* Bris. ähnlich. Unterseite länger und dichter behaart als die Oberseite; Abdomen undeutlich schwarz irrorirt.

Dorytomus cephalotes nov. sp. ♀. *Oblongus, convexus, rufocastaneus, paulo nitidus, haud dense flavo-albido-pubescentis; rostro, pectore elytrorumque margine nigricantibus; capite magno, globoso, fronte profunde foveolata; oculis magnis, rotundatis; rostro cylindrico apice parum dilatato, in capite infixo, femoribus anticis paulo longiore, valde curvato; prothorace subquadrato-convexo, subremote punctulato, margine antico prosterni emarginato et fimbriato; elytris parallelis dense striato-punctatis; callo postico parum indicato, interstitiis planis, confuse remoteque punctulatis; pedibus crassioribus, femoribus anticis haud elongatis, omnibus subtus dente minuto armatis; tibiis rectis.* — Long. 6, lat. 2,2 mm.

Taschkent; Fluss Atrek.

Diese Art hat ganz den Habitus von *tortrix* L. und ist auch neben diesen zu stellen, weicht aber von allen bekanten Arten durch den sehr grossen Kopf mit sehr grossen runden Augen (wie bei den *Balaninus*-Arten), durch den in den Kopf eingepflanzten Rüssel und durch die lange anliegende Behaarung, von *tortrix* ausserdem noch durch stark gekrümmten Rüssel, längeren und feiner punktirten Thorax, viel längere Decken, längere Beine und feineren Schenkelzahn ab.

Der weibliche Rüssel an der Basis gereiht-punktirt, dann glatt glänzend, an der Spitze deutlich verbreitert, hier verworren punktirt und mit längeren schräg abstehenden Haaren besetzt. Fühler in der Mitte eingelenkt, Geisselglied 1 länger als 2, dieses fast doppelt so lang als jedes der folgenden kugligen. Thorax an den Seiten gerundet, zur Spitze nur wenig mehr als zur Basis verengt, die Hinterecken etwas stumpf, oben quer gewölbt, die Mittellinie unpunktirt. Schildchen klein, dreieckig und wie die Decken behaart. Letztere reichlich doppelt so lang als breit, nur wenig breiter als der Thorax, die rechtwinkligen

Schultern sehr abgerundet, die Streifen wenig vertieft, die dichten Punkte in ihnen grösser, die auf den Spatien viel kleiner als die auf dem Thorax, die anliegende Behaarung viel länger als bei allen andern Arten, auf den Schenkeln und Schienen etwas abstehend.

Von den beiden vorliegenden Weibchen ist das von Taschkent kastanienbraun, Spatium 9 ganz, 8 erst von den Hinterhüften ab bis vor die Spitze, der Rüssel und die Brust schwarz; das andre vom Atrek ist bis auf die schwärzlichen Seiten der Hinterbrust ganz hellgelb und wohl nicht ganz ausgefärbt.

Dorytomus ruber nov. sp. ♀. *Oblongo-ovatus, parum depressus, totus ruber, tenuissime pubescens; rostro cum capite continuato femoribus anticis longiore, arcuato, punctis elongatis subseriatim obsito, linea media impunctata; prothorace transverso, intra apicem contracto, ut caput confertim punctato, lateribus pilis crassioribus obsito; elytris prothorace latioribus, basi emarginatis, apice acute rotundatis, undique striato-punctatis, interstitiis coriaceis, dorso postice annulo communi ovato e pilis flavidis ornatis; femoribus submuticis, tibiis anticis intus leviter bisinuatis.* — Long. 5, lat. 1,8 mm.

Transbaikalien (Leder).

Flacher als der verwandte *puberulus* Boh. und wie dieser ohne sattelförmige Einsenkung an der Rüsselbasis, die Punkte auf Kopf und Thorax gröber und weniger dicht, der Rüssel länger, die Deckenstreifen überall gleich flach, die Punkte in ihnen grösser, die Spatien breiter, die Behaarung äusserst fein und schwer sichtbar bis auf die dickere, welche an den Thoraxseiten eine undeutliche Längsbinde bildet und hinten auf den Decken eine gemeinsame grosse ovale Fläche zwischen den fünften Streifen ringförmig einschliesst. Beine länger, Schenkel wenig verdickt und ungezähnt. Thorax an den Seiten bis zur zusammengezogenen Stelle wenig gerundet, etwas vor der Mitte am breitesten. Die Ausrandung des Prosternalvorderrandes jederseits durch eine schwer sichtbare Kiellinie begrenzt.

Orchestes exiguus nov. sp. ist noch etwas kleiner, namentlich aber schmaler als *tomentosus* Oliv., seine Bekleidung undichter, der Thorax wie bei *cinereus* Fbr. geformt, die Augen sind sehr flach, die Hinterschenkel viel dünner als bei ersterem und zeigen keine Spur von Zahnsitzen, die Hinterschienen sind bedeutend kürzer, die Schuppenhaare der Oberseite dünner und anliegend. Von der Grösse und Form des *astrachanicus* Tourn., jedoch mit anderer und undichter Bekleidung.

Astrachan (B. E. Jakowlew).

Miarus Jakowlewi nov. sp. *Ovatus, angustior, depressior, breviter reclinatim pubescens; oculis minoribus; rostro paulo brevior; articulo secundo funiculi primo dimidio brevior, prothorace nonnihil longior; reliquis ut in M. graminis* Gyll. — Long. 3, lat. 1,9 mm.

Irkutsk (B. E. Jakowlew).

Mir liegen zwei Pärchen vor, die mit *graminis* gleiche Grösse, Sculptur und ebenso gezähnte Hinterschenkel haben, aber durch die obigen Merkmale von ihm abweichen. Die Gyllenhalische Art ist breiter, gewölbter, auf Thorax und Decken länger abstehend behaart, ihre Augen sind viel grösser, ihr Rüssel ist in beiden Geschlechtern wie auch der Thorax länger, die Längswölbung ist weniger flach und Geisselglied 2 nicht kürzer, eher länger als 1.

Ceutorrhynchus Herbsti nov. sp. von Samara, Sarepta, Derbent, Armenien ist in den Sammlungen als *C. sareptensis* Ch. Brisout in litt. verbreitet. — Von der Grösse des *marginatus* Payk. und *macula-alba* Hrbst. unterscheidet sich *Herbsti* von ersterem durch die lange Scutellarmakel, den hinter der vorderen Einschnürung kissenartig längsgewölbten Thorax, durch die nicht erhaben gerandete Thorax- und Deckenbasis, durch feinere Behaarung in den Punktstreifen und gröbere Bekleidung der Spalten sowie durch die ungezähnten, nur mit einem kleinen Haarzipfel versehenen Hinterschenkel verschieden; von letzterem unterscheiden ihn die dickeren und kürzeren einfarbigen Beine, der

kürzere Rüssel, der höchstens im Antescutellareindruck weiss beschuppte Thorax, die nur noch am Aussenrande bei den Hinterhüften mit eingestreuten weissen Schuppen versehenen Decken; von beiden Arten noch durch die stark eingezogenen Thoraxhinterecken verschieden. — Ich besitze unter meinen Stücken des *Herbsti* eins von *Sarepta*, das mir einst von Ch. Brisout als *sareptensis* bezeichnet wurde.

Ceutorrhynchus Gyllenhali habe ich eine neue mit *Lethierryi* Bris. nahe verwandte Art genannt, die sich von diesem durch die deutlich gezähnten vier Hinterschenkel, schwarze Fühler und Tarsen, durch die drei weissen, in der Mitte unterbrochenen Thoraxlinien, den braunen, nur in der Mitte und über den Augen weissen Kopf und auch dadurch unterscheidet, dass die weissen Schuppenborsten in den Deckenstreifen nicht dicker sind als die weissen und braunen auf den Spatien. — Meine Stücke von Finnland und dem Kaukasus haben eine Länge von 2,5 und eine Breite von 1,8 Millimetern.

Die mit *Herbsti* und *Gyllenhali* verwandten und in Russland vorkommenden Arten haben gespaltene Krallen, deutliche Schultern, eine dicht weiss beschuppte Unterseite sowie Scutellarmakel, anliegende Bekleidung und sind nach folgender Tabelle zu trennen.

1. Deckenbasis gerade abgestutzt und erhaben gerandet, einige Deckenspatien hinten mit kleinen Körnerspitzen, die Scutellarmakel höchstens um die Hälfte länger als breit.
2. Thorax ohne Spur eines Seitenhöckers, Pygidium ohne Längsfurche **marginatus** Payk.
2. Thorax mit einem mehr oder weniger deutlichen Seitenhöcker.
3. Pygidium ungefurcht, Thoraxhinterecken nicht eingezogen, grösste Thoraxbreite an der Basis.
4. Thorax ohne helle Längslinien, Kopf einfarbig grau bekleidet, der Schenkelzahn nur durch einen Schuppenzipfel angedeutet.
5. Tarsen und Fühler roth; die weisslichen Schuppenborsten in

- den Streifen sind dicker als die auf den Spatien vorherrschenden braunen **Lethierryi** Bris. ¹⁾.
5. Tarsen und Fühler schwarz; die auf der Oberseite vorherrschenden weisslichen Schuppenborsten sind in den Streifen und auf den Spatien gleich dick und nicht dicker als die braunen; sonst dem *Lethierryi* sehr ähnlich. — Länge 2, Breite 1,2 mm. — Irkutsk (B. E. Jakowlew) **cupidus** n. sp.
4. Thorax mit drei in der Mitte undeutlichen oder unterbrochenen Längslinien, die vier Hinterschenkel deutlich gezähnt; Kopf braun bekleidet mit weisslicher Mitte und einem solchen Punkt über den Augen; Tarsen und Fühler schwarz, die weisslichen Schuppenborsten in den Streifen nicht dicker als die braunen auf den Spatien **Gyllenhali** n. sp.
3. Pygidium gefurcht, Thoraxhinterecken deutlich eingezogen.
6. Tarsen schwarz **punctiger** Gyll.
6. Tarsen roth var. **rufitarsis** Gyll.
1. Deckenbasis ausgebuchtet, nicht erhaben gerandet, alle Deckenspatien reibeisenartig sculptirt, die weisse Scutellarmakel mindestens doppelt so lang als breit. Schenkel ungezähnt, der Zahn durch einen Schuppenzipfel angedeutet.
7. Schienen, Tarsen und Fühler gelb, grösste Thoraxbreite an der Basis, Oberseite dichter bekleidet, die weissen Schuppenborsten in den Streifen und auf den Spatien gleich dick, Rüssel länger, Schenkel schlanker und länger. **macula-alba** Hrbst.
7. Schienen, Tarsen und Fühler schwarz, Thoraxhinterecken gerundet-eingezogen, daher die grösste Thoraxbreite vor der Basis, Oberseite viel undichter bekleidet, die weissen Schuppenborsten in den Streifen viel dicker als die auf den Spatien, Rüssel kürzer, Schenkel kürzer und dicker . . . **Herbsti** n. sp.

Ceutorrhynchus sibiricus nov. sp. ♀. *Ovalis, angustus, piceus, subtus densius albido-squamosus, antennis pedibusque dilutioribus;*

¹⁾ Mir fehlen spanische Stücke dieser Art; ich bin daher nicht sicher, ob meine kaukasischen Stücke wirklich dieser Art angehören.

unguiculis simplicibus, femoribus muticis; prothorace conico, basi truncato, margine antico minus alte elevato, utrinque vix tuberculato; elytris punctato-striatis, basi subelevato - marginotis. —
Long. 2, lat. 1 mm.

Irkutsk (B. E. Jakowlew).

In die *rapae*-Gruppe gehörig. Oberseite mit dünnen braunen Schuppenborsten und weisslichen länglichen Schuppen weniger dicht besetzt als die Unterseite. Rüssel so lang als Kopf und Thorax, gebogen, dicht punktirt. Kopf gewölbt mit eingestreuten weissen Schuppen. Geisselglied 1 dicker und wenig länger als 2, Keule mindestens dreimal so dick als die Geissel. Thorax fast so lang als breit, die Basis gerade abgestutzt, vor dem Schildchen leicht gefurcht, die Seiten und die Mitte weisslich beschuppt. Decken von den Thoraxhinterecken ab sehr schräg abfallend und wenig erweitert, reichlich um die Hälfte länger als breit, die flachen Spatien ohne Spur von Körnchen oder Körnerspitzen, die weisslichen Borstenschuppen in den Streifen viel dünner als die auf den Spatien, aber nicht dicker als die auf diesen vorherrschenden braunen. Schenkel sehr dünn.

