

DE

LA CLASSE PHYSICO-MATHÉMATIQUE

DE

L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE SAINT-PÉTERSBOURG.

Ce journal paraît irrégulièrement par feuilles détachées dont vingt-quatre forment un volume. Le prix de souscription, par volume, est de 2 roubles argent tant pour la capitale, que pour les gouvernements, et de 2 écus de Prusse pour l'étranger. On s'abonne, à St.-Petersbourg, au Comité administratif de l'Académie, place de la Bourse No. 2, et chez W. GRAEFF, héritiers, libraires, commissionnaires de l'Académie, Nevsky-Prospect No. 1. — L'expédition des gazettes du bureau des postes se charge des commandes pour les provinces, et le libraire LEOPOLD VOSS à Leipzig, pour l'étranger.

Le BULLETIN SCIENTIFIQUE est spécialement destiné à tenir les savants de tous les pays au courant des travaux exécutés par les classes I et III de l'Académie, et à leur transmettre, sans délai, les résultats de ces travaux. A cet effet, il contiendra les articles suivants: 1. Bulletins des séances de l'Académie; 2. Mémoires lus dans les séances, ou extraits de ces mémoires, s'ils sont trop volumineux; 3. Notes de moindre étendue *in extenso*; 4. Analyses d'ouvrages manuscrits et imprimés, présentés à l'Académie par divers savants; 5. Rapports; 6. Notices sur des voyages d'exploration; 7. Extraits de la correspondance scientifique; 8. Nouvelles acquisitions marquantes de la bibliothèque et des musées, et aperçus de l'état de ces établissements; 9. Chronique du personnel de l'Académie; 10. Annonces bibliographiques d'ouvrages publiés par l'Académie. Les comptes rendus annuels sur les travaux de l'Académie entreront régulièrement dans le Bulletin, et les rapports annuels sur la distribution des prix Démidoff seront également offerts aux lecteurs de ce journal, dans des suppléments extraordinaires.

SOMMAIRE. NOTES. 13. Détermination des espèces des Coléoptères recueillies en Songarie par M. Schrenk. GEBLER. 14. Diagnoses des Composées nouvelles recueillies en Songarie par M. Schrenk. FISCHER et METZ. BULLETIN DES SÉANCES.

NOTES.

13. CHARAKTERISTIK DER VON HN. DR. SCHRENK IN DEN JAHREN 1842 UND 1843 IN DEN STEP-PEN DER DSUNGAREI GEFUNDENEN NEUEN COLEOPTEREN-ARTEN; VON DR. GEBLER. (Lu le 19 avril 1844.)

1) *Cicindela Kirilowii* Fisch.

Fischer de Waldheim in litt. C. descendens, ejusdem Catalogus Coleopterorum Karelini, pag. 3.

Sub-cylindrica, supra virescenti-aenea, sub-obscura, thorace obsolete impresso, elytris puncto humerali, altero ante medium, fascia oblique descendente, sinuata medii lunulaque apicis subangulata angustis, albis, pedibus viridi-aeneis.

Long. $4\frac{1}{2}$ — 5 lin., latit. $1\frac{1}{2}$ lin.

Subtus pectore cupreo-aeneo, abdomine coeruleo-aeneo. Statura C. gracilis; valde affinis C. descendenti Fisch. Bulletin de Moscou VIII, pag. 160; at hinc color smaragdinus, thorax profundius impressus, elytrorum

profundius punctatorum fasciae minus anguletae, tibiae et tarsi rufo-piceae.

Manibus beati Kirilowii, botanici indefessi (socii D. Karelini in itinere Dsungarico) dedicata.

Lecta a Dis. Karelini, Kirilow et Schrenk ad lacum Balchasch.

2) *Cymindis rufescens*.

Oblonga, rufo-picea, nitida, pilosa, thorace angusto, cordato, ad latera punctato, margine vix reflexo; elytris punctulato-striatis, interstitiis subtilissimis et parce punctulatis.

Long. $4\frac{1}{2}$ lin.; lat. $1\frac{1}{2}$ lin.

Statura C. miliaris; colore, nitore, puncturaque distincta.

Unicum specimen in desertis ad lac. Balchasch lectum, cui elytra medio late longitudinaliter impressa; forsitan casu?

3) *Cymindis ruficollis*.

Fusca, obscura, griseo-pubescentis, subtiliter et confertim punctulata, antennis, pectore thoraceque ferrugineis, hoc lateribus depresso, postice angustato, denticulo obsolete, angulis omnibus obtusis; elytris depressis, postice latioribus, subtus pedibusque testaceis.

Long. $3\frac{1}{4}$ lin.; lat. $1\frac{1}{2}$ lin.

Thorax C. miliaris, at lateribus ante apicem magis dilatatus; ceterum similis C. melanocephalae et C. rufipedi.

Specimen captum ad fl. Tschui (in monticulis Chan-tau).

4) *Cymindis* (*Glycia* Chaud.?) *tricolor*.

Nitida, capite, abdomine femoribusque atris, antennis, collo, thorace, tibiis tarsisque rufis, elytris linearibus, apice truncatis, antice rufis, postice laete cyaneis

Long. $2\frac{1}{2}$ lin.; lat. 1 lin.

Statura C. Andreae et C. vittatae Zubk. Supra pilis fulvis adpersa. Thorax cordatus, angulis posticis prominulis, acutis, supra subtilissime punctulatus. Elytra oblongo-quadrata, ante apicem sub-dilatata, striata, interstitiis punctulatis.

Ad littora lac. Balchasch duo specimina lecta.

5) *Sphodrus* *Schrenkii*.

Niger, thorace transverso, sub-cordato, transversim-ruguloso, lateribus apicem versus parum reflexo, angulis basalibus acutis, elytris oblongis, supra punctato-striatis, punctis profundioribus, confertis, interstitiis planis, late transversim rugulosis.

Long. 11 — 12 lin.; lat. 4 — $4\frac{1}{2}$ lin.

Affinis S. laticolli. distinctus vero thoracis margine antice minus reflexo, elytris angustioribus, striis evidentius punctatis, interstitiis magis inaequalibus. A S. Goliatho differt magnitudine, thorace brevioris, angulis posticis acutis, elytris rugulosis.

In districto kirgisisco Karkaruli rarus.

6) *Ampedus* *suturalis*.

Elongatus, rufus, capite, antennis, scutello, elytrorum sutura, subtus thoracis medio, pectore pedibusque nigris, tarsis piceis; capite subimpresso, thorace punctulato, elytris punctato-striatis.

Long. 4 lin.; lat. $1\frac{1}{4}$ lin.

Statura fere A. tristis. Affinis forsitan A. coecineo Fischeri (Catalogus insectorum pag. 8), mihi invisio. Antennae compressae, extrorsum crassiores, articulis brevioribus, obconicis, ultimo ovato.

Dua specimina ibidem capta.

7) *Malachius* *fulvicollis*.

Viridi-aeus, antennis serratis, extrorsum sub-crasioribus, articulis 6 baseos, thorace, abdominis segmentorum marginibus, tibiis tarsisque fulvis; elytris deplanatis, apice singulatim rotundatis.

Long. 2 lin.; lat. $\frac{3}{4}$ lin.

Statura M. viridis. Corpus subtus nigro-virescens, nitidum.

Duo specimina in desertis ad lac. Balchasch capta.

8) *Hister* *fasciolatus*.

Late ovatus, ater, thoracis lateribus, elytrisque basi et ultra medium punctulatis, stria suturali abbreviata, 4 dorsalibus obliquis, ad medium usque productis, aequalibus, fasciola suturam non attingente, medio utrinque unidentata, lutea.

Long. $2\frac{1}{3}$ lin.; lat. $1\frac{1}{2}$ lin.

Valde affinis H. externo et biguttato Fisch.; differt statura angustiore, fascia dentata interrupta, nec macula rotundata elytrorum; a H. interrupto Payk. differt magnitudine, forma fasciae striaque tertia elytrorum longiore. Forsan idem, ac H. interruptus Entomographiae Rossicae II, pag. 207, tab. XXV, fig. 7.

In deserto specimen unicum lectum.

9) *Scarabaeus* *quadri-dens*.

Oblongus, punctatus, clypeo antice rotundato, dentibus acutis, 2 approximatis inter antenas, 2 reflexis apicis armato, thoracis lateribus valde dilatatis.

Long. $8\frac{1}{2}$ lin.; lat. $4\frac{1}{2}$ lin.

Affinis S. punctato; at minor, piceus, nitidus, subtus ferrugineus, oblongus, nec oblongo-ovatus, dentibus clypei basi angustioribus, thoracis lateribus magis dilatatis.

Specimen unicum ad fl. Tschui lectum.

10) *Zophosis* *nitida*.

Oblongo-ovata, nigra, nitida, convexa, capite apice bi-impresso thoraceque laevibus, elytris apice angustatis, supra subtilissime ruguloso-punctatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ lin.; lat. $1\frac{1}{3}$ lin.

Statura Z. sub-metallicae; Z. minutae angustior. Caput antice late rotundatum, inter antenas utrinque impressum, fronte sub-canaliculata.

In deserto ad fl. Tschui lectum specimen et dua simillima, sed duplo minora.

11) *Capnisa*? *Schrenkii*.

Oblongo-ovata, nigra, nitida, thorace transverso, basi leviter bi-sinuato, subtilissime punctulato, elytris evidentius punctatis, modice convexis.

Long. 4 lin.; lat. 2 lin.

Insectum dubium, statura Z. ovuli, C. Karelini minus dilatatum et minus convexum. Palporum maxillarum articulus ultimus latior, fere securiformis. Antennae tenues, filiformes, extrorsum subcrassiores, articulo penultimo globoso, ultimo acuminato. Elytra ultra medium sub-

dilatata. Pedes validiusculi, tibiis sub-triangularibus, inter-
nibus, apice bi-spinosis. Corpus subtus convexum.

Due specimina in deserto ad fl. Tschui lecta.

12) *Pimelia punctata*.

(Melanostolae Dej. spec. teste Com. Mannerheim.)

Obscura, nigra, thoracis disco laevi, lateribus antice
dilatatis, baseos medio sub-sinuato, elytris ovatis, late-
ribus rotundatis, disco sensim dehiscentibus; supra sub-
tiliter rugulosis, singulo seriebus 8, apicem non attingentibus e punctis impressis, latis, remotis, anterioribus
basi aciculo parvo, depresso tectis.

Long 13 lin.; lat. 6 lin.

Statura fere P. cephalotis; sed elytrorum discus con-
vexior etc.

Habitat in deserto ad fl. Tschui.

13) *Trigonoscelis Schrenkii*.

Sub-nitida, thorace medio remote granulato, postice
laevi; elytris albo-pruinosis, granulis majoribus, nitidis,
ad suturam seriatim, ad marginem vagis tectis, inter-
stitiis laevibus.

Long. 9½ lin.; lat. 4½ lin.

Statura T. echinatae. Nigra. Differt ab illa thorace
parce granulato, elytrorum disci granulis majoribus,
globosis. Affinis videtur T. mirabili Fald. (Bulletin de
Moscou, T. IX, tab. VII, fig. 5); at thorax parce punc-
tulus, non canaliculatus, ad basin et apicem laevis etc.

In deserto inter lac. Balchasch et fl. Tschui duo spe-
cimina lecta.

14) *Adesmia Geblert C. Mannerheim in litt.*

Obovata, thorace brevissimo, laevi; elytris dorso for-
nicatis, costa disci abbreviata acuta alteraque marginis
acute serrata, interstitiis et subtus foveis rugisque inae-
qualibus.

Long. 5 — 6 lin.; lat. 3 — 3½ lin.

Statura A. Karelini. Nigra, nitidula. Ad fl. Tschui. D.
Karelin eandem in Turcomannia detexit et nomen jam
occupatum (v. Bulletin de Moscou, 1841, N. IV.) A.
Karelini dedit, qua re nomen D. Comitum a Manner-
heim conservavi.

15) *Akts truncata*.

Thorace apice angustato, profunde exciso angulis
acutis, margine laterali reflexo, basi truncato, supra con-
vexo; elytris convexusculis, ruguloso-punctatis; lateribus
carinis duabus apicem non attingentibus.

Long. 9½ — 12 lin.; lat. 4 — 5½ lin.

Nigra, nitidula. At A. Zablotzkii et aliis differt prae-
cipue thoracis mediae convexiore, angulis posticis non

prominulis, antice parum acutis, margine parum rigu-
loso, angustiore, elytris minus deplanatis, evidentius
punctatis. Valde similem, majorem, thorace basi latiore,
leviter emarginato angulisque obtusis, lateribus anguste
marginatis, elytrorum carina postice longiore, ad littora
maris Caspici lectam absque nomine communicavit D.
Karelin.

Frequentat littora meridionalia lac. Balchasch et sep-
tentrionalia fl. Tschui.

16) *Tentyria laevicollis*.

Nitida, thorace transverso, rotundato, lateribus me-
dio dilatato, basi anguste reflexo, angulis omnibus acu-
tis, supra cum capite vix punctulato, elytris oblongo-
ovatis, convexis, postice modice dehiscentibus, supra
subtilissime rugulosis.

Long. 7 — 7½ lin.; lat. 2½ — 3 lin.

Nigra. Media inter T. gigantem et T. sibiricam, differt
ab illa magnitudine, thorace antice profundius emargi-
nato, lateribus medio, nec ante medium dilatato, ab
hac thoracis basi magis reflexa, angulis acutis, ab utra-
que punctura thoracis subtiliore, oculo armato tantum
visibili, elytris minus dehiscentibus.

Frequentat desertum ad fl. Tschui

17) *Anatolica tatarica*.

Nitida, clypeo lateribus rotundato, utrinque impresso,
capite thoraceque confertim punctulatis, hoc transverso,
subquadrato, lateribus ante apicem latioribus; elytris
oblongo-ovatis, supra dense punctulatis et transversim
rugulosis, dorso late impresso.

Long. 4½ — 6½ lin.; lat. 1½ — 2½ lin.

Nigra. Statura T. angusticollis m. (T. constrictae Stev.),
a qua differt thorace brevior, elytris impressis, densius
punctulatis, clypeo longitudinaliter, nec transversim
impresso.

In desertis ad lac. Balchasch et fl. Ile.

18) *Blaps transversalis*.

Oblonga, thorace quadrato, depresso, parce punctu-
lato, margine reflexo; elytris dorso parum elevatis, la-
teribus et postice abrupte dehiscentibus, apice breviter
mucronatis, supra punctulatis, late transversim undulato-
rugosis.

Long. 10 — 12½ lin.; lat. 4½ — 5½ lin.

Nigra, parum nitida. Rugis latis, transversis, undula-
tis, marginem non attingentibus ab omnibus, mihi cog-
nitis, differt. Mucro feminae brevissimus, maris duplo
longior.

In montibus Chantau et ad lac. Balchasch saepius oc-
currit.

19) *Blaps caulata*

Oblongo-ovata, thorace transverso, sub-quadrato, depresso, confertim punctato. elytris granulato-rugosis, margine humerali reflexo, medio sub-dilatatis, apice abrupte debiscentibus, mucrone, maris elongato, armatis.

Long. $10\frac{1}{2}$ - 12 lin.; lat. $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$ lin.; long. mucronis maris $1\frac{1}{2}$ - 2 lin.; feminae $\frac{1}{2}$ lin.

Nigra, sub-opaca. Statura B. reflexicollis; affinis B. granulatae m. (Hummel essais entomologiques IV, pag. 47) differt thorace magis depresso, minus confertim punctato, elytris obsolete granulatis; a B. granulosa Ménétr. (teste C. a Mannerheim) thorace apicibus truncato, femoribus anticis inermibus; ab utraque mucrone maris elongato.

In montibus Chantau et at fl. Tschui frequens.

20) *Proxodes brevis*,

Oblongo-ovata, fornicata, thorace transverso, confertim punctulato, elytris brevibus, coriaceis, ultra medium sublacionibus, margine inflexo, apice obtusis.

Long. $5\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ lin.; lat. $2\frac{1}{2}$ - $3\frac{1}{2}$ lin.

Statura fere *Platyscelis hypolithi*. Nigra, nitidula. Femina differt statura latiore, punctura profundiore, antennis tarsisque brevioribus.

In desertis ad fl. Ajagus a D. D. Karelin et Schrenk detecta.

21) *Mylabris Mannerheimii*.

Antennis brevibus; nigra, hirta nitida, thorace convexo, non foveolato, elytris rubro-luteis, rugosis, macula suturali ad scutellum et basin producta, altera sub-humerali, duabus approximatis, saepius confluentibus ad apicem fasciaque dentata medii nigris.

Long. $4\frac{1}{2}$ - 5 lin.; lat. $1\frac{1}{2}$ lin.

Nigro-pilosa. Statura M. pusillae, affinis M. calidae individuis minoribus; sed nitidior, brevior, thorace non foveolato, elytrorum sutura antice et basi nigris; a M. sibirica differt colore et maculis posticis approximatis.

In desertis ad fl. Ajagus a D. D. Karelin et Schrenk lecta, congeneribus minus copiosa.

22) *Cleonus Samsonowii*.

Antennarum articulo tertio secundo brevior, rostro bi-sulcato, carinato, crasso, medio compresso, oblongus niger, supra plagiatis fusco-alboque squamosus, capite non constricto, thorace elytris granulatis denudatis nigris confertim adpersis, illo basi truncato, his subtiliter striatis, subtus dense albo-sericeo-squamosus, nigro-tuberculatus.

Long. 8 - 9 lin.; lat. $2\frac{1}{2}$ - 3 lin.

Statura C. cenchri; ab eo et C. marmorato differt magnitudine, granulis densioribus, thorace truncato etc.

In deserto et in montibus Alatau lectus a D. D. Samsonow, mercatore, entomologiae cultore, et Karelin.

23) *Cleonus elongatus*. (*Bothynoderes*.)

Rostro sensim attenuato, apice rotundato, elongatus, niger, dense albo-tomentosus, thorace antice utrinque impresso, dorso late impresso et medio carinato, fovea profunda scutellari; elytris apice abrupte acumina-tis, antice transversim impressis, subtiliter punctato-striatis, maculis parvis, fuscis, subtus abdominis segmento secundo puncto basali, nigro.

Long. $7\frac{1}{2}$ - $8\frac{1}{2}$ lin.; lat. $2\frac{1}{2}$ - 3 lin.

Statura C. brevis, a quo differt forma thoracis, striis elytrorum etc.

Duo specimina in deserto lecta.

24) *Cleonus Schrenkii* (*Bothynoderes*.)

Rostro sensim attenuato, apice sub-rotundato, crasso, brevi, oblongus, niger, dense albido-squamulosus, thorace recto, ante apicem abrupte angustato, remote punctato, impresso, dorso fusco, elytris brevibus, apice singularim rotundatis, ad basin transversim sub-impressis, subtilissime punctato-striatis, abdomine puncto nigro.

Long. 7 lin.; lat. $2\frac{1}{2}$ lin.

Statura fere B. brevis, a quo differt forma thoracis, antennis tarsisque brevioribus.

In desertis ad lac. Balchasch 4 specimina lecta.

25) *Ottiorhynchus ursus*.

Articulis antennarum intermediis brevibus, apice truncatis, femoribus dentatis, nigro-brunneus, nitidus, griseo pilosus, capite laevi, rostro ruguloso, thorace angusto, convexo, remote et profunde punctato, elytris oblongo-ovatis, lateribus parum dilatatis, postice rotundatis, supra planiusculis, striato-punctatis, interstitiis remote punctatis, antennis pedibusque ferrugineis.

Long. 3 lin.; lat. 1 lin.

Statura O. brunnei, a quo differt forma thoracis, antennis tarsisque brevioribus.

In deserto districtus Karkarali 4 specimina lecta.

26) *Clytus quinque-maculatus*.

Subtus pallido — supra flavo-virescenti — pubescens, thorace convexo, lateribus rotundato, maculis 2, elytris oblique truncatis, macula humerali, altera ante medium, duabus mediis, quinta ceteris majore ante apicem nigra.

Long. 5 lin.; lat. $1\frac{1}{2}$ lin.

Affinis C. Verbasci et C. Faldermanni Dej.; mihi in-viso, diversus tamen thorace latiore, forma numeroque macularum et colore pedum.

Unicum specimen ad fl. Tschui lectum.

27) *Toxotus? tomentosus.*

Testaceus, dense griseo-tomentosus, antennis compressis, sub-serratis, corpore longioribus, thorace acute spinoso, elytris remote punctatis, apice rotundatis.

Long. 6 lin.; lat. 2 lin.

Statura T. meridiani. Forma antennarum ab omnibus congeneribus differt.

Ad fl. Ajagus et Tschui a D. D. Schrenk et Karelin lectus.

28) *Stenura nebulosa.*

Nigra, obscura, elytris indeterminate nigro-testaceo-nebulosis, alutaceis, tri-striatis, apice rotundatis, antennarum articulis et femoribus basi tibiisque anterioribus medio testaceis.

Long. maris 6 lin., feminae 9 lin.; lat. maris 1½, feminae 2½ lin.

Statura St. thoracicae. Mas antennis filiformibus, abdominis segmentis rufo-testaceis; femina antennarum articulis apice sub-crassioribus, elytris abdomine brevioribus.

Ad fl. Ajagus capta.

29) *Lema quadri-maculata.*

Coeruleo-virescens, nitida, thorace foveola profunda disci impressa, elytris remote seriatim punctatis, ano tibiisque testaceis, singulo maculis 2 coeruleo-virescentibus.

Long. 2 lin.; lat. 1 lin.

Statura L. paracenthesos vel potius L. 10-punctatae m.

Cum ea occurrit alia, tota coeruleo-virescens, ceterum simillima; mihi videtur varietas ejus. A L. 10-punctata differt elytris profunde punctatis et aliter coloratis, colore tibiis etc.

30) *Casida apticalis.*

Nigra, obscura, elytris linearibus, disco convexo, trico-stato, interstitiis rugulosis, macula laterali, thoracis apice, antennarum basi pedibusque flavis.

Long. 2½ lin.; lat. 1½ lin.

Statura C. atratae, at minor et multo angustior. Thorax basi late canaliculatus, utrinque fovea impressa.

Semel in deserto capta.

31) *Chrysomela unicolor.*

Oblonga-ovata, nigro-aenea, nitida, thorace subtilissime punctulato, margine incrassato, elytris punctulatis, punctis majoribus per paria seriatim dispositis.

Long. 3½ lin.; lat. 2½ lin. et songaricae m., differt ab hac colore, thorace elytrisque subtilius punctulatis, illius margine toto incrassato; a Ch. morione Dej. thorace angustiore, margine minus incrassato, elytrorum punctis minoribus, minus distantibus.

Unicum specimen in vicinis fl. Tschui captum.

32) *Gastrophysa ruficeps.*

Oblongo-ovata, capite, thorace pedibusque fulvis, elytris subtilissime vage punctulatis.

Long. 1½ lin.; lat. 1 lin.

Affinis G. Polygoni; differt colore capitis et thoracis fulvo, nec rufo, ani coeruleo, punctura elytrorum multo subtiliore.

33) *Chrysochus punctatus.*

Viridi-coeruleus, aeneus, punctatus, thoracis lateribus sub-rectis.

Long. 6 — 7 lin.; lat. 3 — 3½ lin.

Statura Ch. aurati; differt ab omnibus colore et punctura capitis, thoracis et elytrorum, ab asiatico thoracis lateribus vix dilatatis, a pretioso thorace minus fornicato, ab aurato magnitudine.

Habitat ad fl. Tschui.

34) *Coccinella vittata.*

Sub-hemisphaerica, nigra, nitida, confertim punctulata, thoracis lateribus, elytrorum lunula postica, antrosum angustiore, antennarum basi, tibiis tarsisque rufis.

Long. 2 lin.; lat. 1½ lin.

Statura C. 6-pustulatae.

Specimen unicum in deserto captum.

14. DIAGNOSES COMPOSITARUM NOVARUM, A CL. AL. SCHRENK ANNO 1843 IN SONGARIA LECTARUM. (Lu le 3 mai 1844.)

Artemisia Santolina Schrenk.

A. (*Seriphidium*) caulibus basi fruticosis ramosissimis foliisque junioribus incano-tomentosis demum glabratis; foliis inferioribus elongatis pectinato-pinnatisectis: segmentis numerosis abbreviatis inciso-dentatis foliisque superioribus subsessilibus obtusis subintegerrimis; panicula ramosissima divaricata; calathidiis oblongis canescentibus: squamis obtusis scarioso-marginatis. — Species foliis suis, *Santolinae squarrosae* similibus, in genere distinctissima. — In ripa fluvii Ile, locis arenosis, initio Augusti m. nondum florentem, inventa.

Artemisia leucodes Schrenk.

A. (*Seriphidium*) biennis, tota albo-lanata subsericea; caulibus erectis ramosis; foliis inferioribus petiolatis