

BRENTUS. *Antennae moniliformes, ultra medium rostri exsertae.*

Os rostro porrecto, recto, cylindrico.

* *femoribus simplicibus.*

- barbicor- 1. Br. cylindricus, rostro longissimo subtus barbato, elytris
nis. elongato-elevatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 1.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 59. Curculio barbicornis.
Habitat in nova Seelandia.
- assimilis. 2. Br. cylindricus, rostro apice glabro atro, elytris ferrugineo-lubfasciatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 2.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 60. Curculio assimilis.
Habitat in nova Seelandia.
- monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis unistriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 95. n. 3.*
Habitat in nova Hollandia, statura barbicornis, at minor.
- semipunctatus. 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 4.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 171. n. 61. Curculio semipunctatus.
Habitat in nova Hollandia.

** *femoribus dentatis.*

- Druryanus. 5. Br. aeneus, thorace tereti, antennis rostro longioribus, elytris apice spinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall. inf. ross. 1. p. 16. n. 3.*
Drury inf. t. 42. f. 37.
Habitat - - -
- Anchorago. 6. Br. linearis, elytris flavo-striatis, thorace elongato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 5.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118.
Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 56. Mus. Lud. Ulr. 52. Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 118. Curculio anchorago.
Degeer inf. 5. p. 273. n. 8. t. 15. f. 28. Curculio longicollis.
Gron. zooph. 583. t. 15. f. 4.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6.
Habitat in America australi et India.

- hastile. 7. Br. ætérinus rostro tenuissimo longo ad apicem subarcuato, thorace medio coarctato, elytris subfalcatis, apice subacuminatis. *Pall. inf. russ. 1. p. 25. n. 2.*
Habitat - - - sesquipollicem longus, crassitie vix libellæ puellæ.
- nasutus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato aeneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 6.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 119. Curculio nasutus.
Habitat in Jamaica, anchoragini affinis, at paulo major.
- dispar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro-striatis. *Fabr. mant. 1. p. 96. n. 7.*
Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 55. Mus. Lud. Utr. 50. Fabr. sp. inf. 1. p. 182. n. 120. Curculio dispar.
Pall. inf. russ. 1. p. 24. t. B. f. 4. Curculio anomaliceps.
Habitat in America.
- cylindri- 10. Br. thorace rotundato nigro-aeneo, elytris ferrugineis
 cornis. flavo substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 8.*
Habitat in nova Seelandia, statura et magnitudine disparis.
- bifrons. 11. Br. niger, elytris striatis: maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 96. n. 9.*
Habitat in Cayenna, statura anchoraginis.

202. CURCULIO. *Antennæ clavatæ, infidentes*
rostro corneo, prominenti.
Palpi quatuor filiformes.

* *Longirostres.*

† *femoribus simplicibus.*

- Gigas 55. C. thorace elytrisque scabris, antennis apice albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 161. n. 1. mant. inf. 1. p. 97. n. 1.*
Habitat in Japonia.
- palmarum. 1. C. ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Mus. Lud. Utr. 42.* Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 2. mant. inf. 1. p. 97. n. 2.*
*D. Geer inf. 5. p. 269. n. 4. t. 15. f. 26. Curculio longi-
 oltus, antennis fractis &c.*

Rumpf

Rumpf qmb. 1. p. 79. t. 17. f. g. Cossus saguarius.

Petro. gazoph. f. 35. f. 5.

Scop. ann. hist. nat. 5. p. 89. n. 40.

Gron. zooph. 578. t. 16. f. 4.

Merum. surin. t. 48. f. 3.

Sulz. hist. inf. t. 3. f. 20.

Habitat in Indiae palmis.

Larva affata in delicias. Jacq. stirp. am. 278.

- eruenta- 56. *C. ater*, thorace lineis, elytrisque punctis duobus sangui-
tus. neis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 3. mant. inf. 1. p. 97. n. 3.*
Habitat in Carolina, c. palmarum minor.
- longipes. 96. *C. nigricans*, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pe-
dibus anterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162.*
n. 4. mant. inf. 1. p. 97. n. 4.
Drury inf. 2. t. 33. f. 3.
Habitat ad caput bonae spei.
- aniae. 550. *C. ruber*, thoracis linea nigra, rostro fetaceo longissimo.
Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 129. t. 1. f. 7.
Habitat ad caput bonae spei, in cycade caffra, larva hexa-
pus, sexu albidus obfessa integ squamas strobili feminei,
nucibus rubraque carne hanc obvelante vitans.
- exoticus. 554. *C. griseus*, thoracè basi impicco, dorfi iuga brevi, ely-
tris postèus gibbis. punctorum alborum ordinibus de-
cem, interstitiis, profunde nigro punctatis. *Mus. Lesk.*
p. 18. n. 368.
Habitat extra Europam.
- brachy- 555. *C. ater*, thorace plano punctato: linea media parum ele-
pteros. vata, elytris abbreviatis subtriatis: interstitiis punctatis.
Mus. Lesk. p. 18. n. 374.
Habitat in Europa.
- undatus. 556. *C. niger*, elytris ordine punctatis: fasciis undulatis in-
terruptis albis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 379.*
Habitat in Europa.
- atomari- 557. *C. fuscus*, elytris striatis: interstitiis lacissime punctatis
us. atomis griseis pilosis adspersis, tibus iustis. *Mus. Lesk.*
p. 18. n. 380.
Habitat in Europa.

- coccineus. 558. *C. coccineus*, elytris punctatis: punctorum ordinibus decem. *Mus. Lesk. p. 18. n. 381.*
Habitat in Europa.
- futuralis. 559. *C. griseus*, elytris striatis: futura albida nigro punctata, macula communi oblonga versus apicem marginumque exteriorum posteriorum punctis nigris. *Mus. Lesk. p. 18. n. 384.*
Habitat in Europa.
- indus. 2. *C. ater*, thorace subovato excavato punctato, elytris rugosofulcatis, tibiis spinosis. *Mus. Lud. Utr. 43.* Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 5. mant. inf. 1. p. 97. n. 5.*
Degeer inf. 5. p. 265. n. 1. t. 15. f. 22.
Habitat in India.
- paganus. 97. *C. griseus*, thoracis dorso fusco: arcubus cinereis, rostro bifurcato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 6. mant. inf. 1. p. 197. n. 6.*
Habitat in America australi et India.
- Elephas. 98. *C. fuscus*, thorace elytrisque variolosis, elytris posterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 162. n. 7. mant. inf. 1. p. 97. n. 7.*
Habitat in Africa aequinoctiali, magnus.
- hemipterus. 3. *C. obscure purpurascens*, elytris abbreviatis, femoribus medio ciliatis. *Mus. Lud. Utr. 44.* Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 8. mant. inf. 1. p. 97. n. 8.*
Degeer inf. 5. p. 271. n. 5. t. 15. f. 25. Curculio rufofasciatus.
Subz. hist. inf. t. 4. f. 5.
Habitat in India.
- variegatus. 99. *C. rufus nigroque varius*, rostro apice nigro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 163. n. 9. mant. inf. 1. p. 97. n. 9.*
Habitat ad caput bonae spei.
- alliariae. 4. *C. violaceus totus.* *Fn. suec. 580.* Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 40. mant. inf. 1. p. 101. n. 53.*
Fn. suec. 468. Curculio nigro-caeruleascens.

Degeer

Curculionum longirostrium larvae plurimae fructus et semina, brevirostrium vero solum consumunt; aliae etiam caules consumunt.

Degeer inf. 5. p. 251. n. 39. Curculio caeruleus.

Frisch inf. 9. 35. t. 18.

Habitat in erysimi althariae caulibus, quos perforat.

erysimi. 100. *C. niger, thorace bituberculato virescente, elytris cyaneis. Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 54.*
Habitat Kilonii, cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.

cyaneus. 5. *C. ater, elytris violaceis, scutello albo. Fn. succ. 581.**
Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 41. mant. inf. 1. p. 101. n. 55.
Degeer inf. 5. p. 252. n. 41. Curculio longirostris, antennis rectis &c.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 70. n. 11. t. 24. f. 5. c.
Habitat in Europae borealis potissimum salicibus.

cracca. 6. *C. gibbus supra ater, subtus cinereus. Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 42. mant. inf. 1. p. 101. n. 56.*
Syst. nat. XII. 2. p. 606. n. 6. Curculio longirostris niger ovatus, rostro fubulato, abdomine pallido.
Degeer inf. 5. t. 6. f. 31. 32? Curculio viciae.
Habitat in Europae viciarum seminibus, pediculi magnitudine.

malvae. 101. *C. griseus, elytris pedibusque testaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 168. n. 43. mant. inf. 1. p. 101. n. 57.*
Habitat in Angliae malvis.
Rostrium et abdomen atra.

campanulae. 7. *C. niger ovatus elytris striatis obtusis. Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 31. mant. inf. 1. p. 100. n. 40. Lesk. it. p. 16. t. A. f. 5.*
Degeer inf. 5. p. 226. n. 23. Curculio longirostris, antennis fractis fulcis &c.
Habitat in campanulae rotundifoliae pericarpis incrassatis.

fuscifloris. 102. *C. griseus, pedibus rufis, rostro femoribusque basi nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 32. mant. inf. 1. p. 100. n. 41.*
Habitat in Germaniae plantis.

roboris. 103. *C. rostro thoraceque rufis, elytris violaceis. Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 42.*
Habitat in Saxoniae quercu, statura et magnitudine fuscifloris.

cuprifloris. 104. *C. oblongus viridi aeneus, elytris striatis, rostro cupreo. Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 43.*
Habitat Dresdae in betula, parvus.

- nigriro- 105. *C. viridis* rostro atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 33.*
 tris. *mant. inf. 1. p. 100. n. 44.*
Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 69. n. 8. t. 24. f. 3.
Habitat in Angliæ arvis.
- variabi- 106. *C. subtestaceus*, thorace viridi lineato, rostro apice fusco.
 lis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 34. mant. inf. 1. p. 100. n. 45.*
Habitat Hamburgi.
- rufiro- 107. *C. niger*, rostro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. sp.*
 tris. *inf. 1. p. 167. n. 35. mant. inf. 1. p. 100. n. 46.*
Habitat in Anglia.
- picro- 108. *C. oblongus niger argenteo-holosericus*, rostro dimidiato
 tris, pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 101. n. 47.*
Habitat Hafniæ, rufirostri affinis, at major.
- salicariae. 109. *C. niger*, antennarum basi, coleoptorum disco tibiisque
 testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 36. mant. inf. 1. p.*
101. n. 48.
Habitat in Angliæ lythro salicaria, parvus.
- badensis. 8. *C. niger*, pedibus piceis.
Habitat in Germania, magnitudine c. cerasi, thorace laevi-
usculo ovato, elytris obsolete striatis, femoribus clavatis.
Dr. Blom.
- aegriatus. 9. *C. aeneus* elytris rubris, rostro nigro elongato.
Habitat in Germania, statura c. nucum, sed dimidio minor.
- cerasi. 12. *C. ater*, antennis ferrugineis, thorace bituberculato.
Fabr. sp. inf. 1. p. 167. n. 30. mant. inf. 1. p. 100. n. 138.
Habitat in foliis pruni cerasi.
- quadri- 110. *C. thorace* quadrituberculato nigro, elytris striatis cine-
 tubercula- reo variegatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 100. n. 39.*
 tus. *Habitat Kiloni, parvus.*
- acidu- 13. *C. piceus*, abdomine ovato. *Fn. succ. 584. Fabr. sp. inf.*
 lus: *1. p. 169. n. 46. mant. inf. 1. p. 102. n. 62.*
Geoffr. inf. par. 1. p. 291. Curculio pyriformis nigro, caerule-
lescens,
Degeer inf. 5. p. 235. n. 22. Curculio longirostris antennis
fractis fulcis &c.
Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. t. 24. f. 12.

Habitat

Habitat frequens in Europae borealis et Catabriae floribus tetradymanis.

- flavipes. III. *C. ater*, femoribus luteis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 169. n. 47.
mant. inf. I. p. 102. n. 63.
Geoffr. inf. par. I. p. 272. n. 8. *Rhinomacer subglobosus* &c.
Habitat frequens primo vere in Europae locis apricis calidis,
- purpureus. 14. *C. purpureus nitens*, rostro longissimo. *Fn. suec.* 585.
Fabr. sp. inf. I. p. 169. n. 48. *mant. inf.* I. p. 102. n. 64.
Degeer inf. 5. p. 250. n. 38. *Curculio rostro longissimo* &c.
Priv. gaz. t. 22. f. 5.
Lisf. loq. 394.
Bergstr. nomencl. I. 16. 12. t. 2. f. 12.
Habitat in Europae plantis, frumentario proxime affinis,
- frumentarius. 15. *C. sanguineus*. *Fn. suec.* 586. *Fabr. sp. inf.* I. p. 169. n. 49.
mant. inf. I. p. 102. n. 65. *Degeer inf.* 5. p. 251. n. 40.
Aët. Stockh. 1750. p. 186. n. 1.
Aët. nicrof. 3. p. 391.
Leeuwenh. arc. nat. 168. augm. 6. p. 83. f. 3.
Habitat in Europae frumento diutius asservato, pessimus.
- bituberculatus. 112. *C. ferrugineus*, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorsalibus elevatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 171. n. 58.
mant. inf. I. p. 103. n. 76.
Habitat in nova Seelandia, granario proxime affinis.
- oryzae. 113. *C. piceus*, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 171. n. 57.
mant. inf. I. p. 103. n. 75.
Amoen. acad. 6. p. 395. n. 19. *Curculio (oryzae) longirostris oblongus niger*, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Habitat in oryza, diutius asservata.
- granarius. 16. *C. piceus*, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. suec.* 587. *Fabr. sp. inf.* I. p. 171. n. 56. *mant. inf.* I. p. 103. n. 74. *Scop. ent. carn.* 89.
Geoffr. inf. par. I. p. 285. n. 18. *Curculio rufo-testaceus* &c.
Degeer inf. 5. p. 239. n. 25. *Curculio longirostris, antennis fiactis* &c.
Raj. inf. 88. *Scarabaeus parvus fordide fulvus* &c.

- Fohlot obs. microscop.* 1754. t. 7. f. 1.
Wilcke act. Stockh. 37. tr. 4. nr. 2.
Habitat in frumento diutius in granariis asservato, pessimus; isatide, hyoscyamo, sambuco, thlaspide pelli dicitur.
- dorsalis.** 17. *C. elytris rubris: futura nigra.* *Fn. suec.* 588. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 170. n. 50. *mant. inf.* 1. p. 102. n. 66.
Fn. suec. 1. n. 475. *Curculio niger elytris in medio rufescentibus.*
Herbst apud Fueßli arch. inf. 7. t. 44. f. 10. r. f.
Habitat in Europæ borealis ranunculo ficaria.
- melano-**
cardius. 18. *C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca.* *Mus. Lud. Ulr.* 18. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 10.
Sulz. hist. inf. 40. t. 4. f. II.
Habitat in India.
- crucia-**
tus. 114. *C. niger, thorace subspinoso: lineis, elytris posterius - cruce albis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 10. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 11.
Habitat in nova Hollandia.
- striatu-**
lus. 115. *C. niger, elytris holosericeo-striatis.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 12. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 12.
Habitat in insula terræ novæ.
- Rubetra.** 116. *C. aterlaevis immaculatus, femoribus fulcatis.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 97. n. 13.
Habitat in Cayenna, magnitudine c. pini.
- pini.** 19. *C. elytristestaceis: fasciis nebulosis.* *Fn. suec.* 589.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 163. n. 13. *mant. inf.* 1. p. 97. n. 14.
Degeer inf. 5. p. 222. n. 15. *Curculio longirostris, antennis fractis &c.*
Frisch inf. 11. t. 23. f. 5.
Habitat in pinus, sylvestris cortice, cum c. abietis aliquando copula junctus.
- onopor-**
di. 117. *C. niger cinereo-villosus, rostro atro: utrinque fulco abbreviato baseos.* *Fabr. mant. inf.* 1. p. 98. n. 15.
Habitat in Africae onopordis, vittato affinis, et major.
- colatus.** 118. *C. ferrugineo fuscus albo-lineatus, rostro nigro: utrinque fulco abbreviato baseos.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 164. n. 14. *mant. inf.* 1. p. 98. n. 16.
Habitat in Italia, majusculus.

- jaceae. 119. *C. niger cinereo irroratus*, elytris puncto baseos distincto. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 15. mant. inf. 1. p. 98. n. 17.*
Habitat in Centaurea Jacea, adultior magis glaber.
- punctu-
latus. 120. *C. flavo fuscoque varius*, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 18.*
Habitat in America, statura c. jaceae, at paulo minor.
- cynarae. 121. *C. niger virescenti irroratus*, rostro nigro subcarinato. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 19.*
Habitat in Africae floribus cynarae, c. jaceae affinis, at duplo fere major.
- Colon. 122. *C. griseus*, elytris puncto albo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 16. mant. inf. 1. p. 98. n. 20.*
Mant. p. 531. Curculio longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace utrinque linea, elytris puncto albo.
Geoffr. inf. par. 1. p. 280. n. 6. Curculio oblongus fuscus.
Scop. ent. carn. 104. Curculio palustris.
Schaeff. ic. t. 155. f. 2.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 68. n. 3. t. 24. f. 1.
 β) *Curculio (semicolon) nigricans. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 69. n. 4.*
Habitat in Germania.
- bimacu-
latus. 123. *C. fuscus*, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 98. n. 21.*
Habitat Halae Saxonum, statura C. Colon, at paulo minor.
- bigutta-
tus. 124. *C. niger*, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque posterioribus flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 17. mant. inf. 1. p. 99. n. 22.*
Habitat in Germania.
- bilinea-
tus. 125. *C. fuscus*, elytris lineis duabus punctorum alborum. *Fabr. sp. inf. 1. p. 164. n. 18. mant. inf. 1. p. 99. n. 23.*
Habitat in Germania, mediae magnitudinis.
- tessella-
tus. 126. *C. cinereus*, elytris apice striis albis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 19. mant. inf. 1. p. 99. n. 24.*
Habitat in Germania, mediae magnitudinis.
- decur-
tatus. 127. *C. ater*, thorace plano punctato, elytris abbreviatis substriatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 25.*

Habitat Halæ Saxonum, *statura fere c. palmarum, at quadruplo minor.*

- equiseti. 128. *C. thoracæ laevi, clytris muricatis nigris: punctis duobus apicèque albis. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 20. mant. inf. 1. p. 99. n. 26.*
Herbst apud Fuesli arch. inf. 4. p. 69. n. 5. t. 24. f. 2.
Habitat in Angliæ equiseti arvensi.
- Bufo. 129. *C. fuscus, clytris subreticulatis: fascia media alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 165. n. 21. mant. inf. 1. p. 99. n. 27.*
Habitat in Sibiria.
- atrio- 130. *C. cinereus, rostro arcuato atro. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. 1. p. 99. n. 28.*
 stris. *Habitat Lipsiæ, magnitudine et statura c. equiseti.*
- cupreus. 21. *C. obscure aeneus subtus obscurior. Fn. succ. 593. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 26. mant. inf. 1. p. 608. n. 21.*
Habitat in Europa.
- Tragiæ. 131. *C. aeneus, rostro pedibusque nigris. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 27. mant. inf. 1. p. 100. n. 35.*
Habitat in Tragiæ volubilis femunibus e Brasilia allatis.
- aeneus. 132. *C. niger, clytris aeneis. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 22. mant. inf. 1. p. 100. n. 36.*
Habitat in Angliæ nemoribus.
- curviro- 133. *C. ater nitidus, rostro arcuato. Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 29. mant. inf. 1. p. 100. n. 37.*
 stris. *Habitat in nova Hollandia, parvus.*
- scaber. 22. *C. cinereus, pedibus rufis, clytris scabris. Fn. succ. 592.**
Habitat in Europæ urticis.
- T. al- 23. *C. ater, abdomine ad latera et posterius lacteo. Fn. succ. 594.**
 bum. *Habitat in Westerbothnia.*
- ruficol- 24. *C. ferrugineus, clytris capitisque basi atro-caeruleis. Fn. succ. 595.**
 lis. *Habitat in Europa.*
- Dryados. 134. *C. cinereus, thoracis dorso fusco, clytris testaceis cinereo-undatis. Fabr. mant. inf. 1. p. 102. n. 67.*
Habitat in Sueciæ quercu, parvus.

- futuralis. 135. *C. ovatus fuscus*, linea longitudinali alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 170. n. 51. mant. inf. I. p. 102. n. 68.*
Habitat in Germaniae salice.
- crux. 136. *C. ater*, thorace punctis duobus baseos, elytris futura punctisque sparfis albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 170. n. 52. mant. inf. I. p. 102. n. 69.*
Herbst apud Fueßli arch. inf. 4. p. 70. n. 14. t. 24. f. b. d.
Habitat Hamburgi.
- exclamationis. 137. *C. ater*, elytris puncto lineolaque apicis albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 170. n. 53. mant. inf. I. p. 102. n. 70.*
Habitat in nova Hollandia.
- venustus. 138. *C. fuscus*, thorace elytrisq. albo lineatis, pedibus testaceis. *Fabr. sp. inf. I. p. 170. n. 54. mant. inf. I. p. 102. n. 71.*
Habitat in Anglia, parvus.
- plantaginis. 139. *C. elytris cinereis: macula media fusca.* *Fabr. mant. inf. I. p. 103. n. 72.*
Habitat Halae Saxonum, statura c. rumicis.
- viscaria. 27. *C. subrotundus cinereus*, thorace elytrisq. cinereo-virentibus. *Fn. suec. 598.**
Habitat in lychnidis visariae fructificationibus.
- bipunctatus. 28. *C. cinereus*, elytris macula nigra, tibiis flavescens. *Fn. suec. 599.**
Habitat in Europa.
- quadrimaculatus. 29. *C. nigricans*, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. suec. 600.* Fabr. sp. inf. I. p. 169. n. 44. mant. inf. I. p. 101. n. 58.*
Geoffr. inf. par. I. p. 287. n. 22. Curculio cinereus &c.
Habitat in Europa.
- unifasciatus. 140. *C. supra fuscus*, fascia media cinerea. *Fabr. mant. inf. I. p. 101. n. 59.*
Habitat Halae Saxonum, mediae magnitudinis.
- bifasciatus. 141. *C. niger*, elytris fasciis duabus cinereis: baseos majore undata. *Fabr. sp. inf. I. p. 169. n. 45. mant. inf. I. p. 102. n. 60.*
Habitat in Kilonii plantis.

- lythri. 142. *C. ater*, elytris fascia media abbreviata punctoque posteriore albis, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf. I. p. 102. n. 61.*
Habitat in Uplandiae floribus lythri, parvus.
- quinque- 30. *C. griseus*, coleoptris maculis quinque albis. *Fn. suec. maculatus. 601.**
Habitat in Europa.
- pericar- 31. *C. subglobosus nebulosus*, elytrorum futura basi alba. *Fabr. sp. inf. I. p. 167. n. 37. mant. inf. I. p. 101. n. 49.*
 pius. *Syst. nat. XII. 2. p. 609. n. 31. Fn. suec. 602.** *Curculio longirostris subglobosus nebulosus*, coleoptris macula cordata alba.
Habitat in scrophulariae pericarpis.
- stymphrii. 143. *C. albo-fuscoque varius*, elytris puncto baseos elevato atro, rostro nigro. *Fabr. sp. inf. I. p. 168. n. 38. mant. inf. I. p. 101. n. 50.*
Habitat Kilonii, in stymphrio amphibio.
- capreae. 144. *C. coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis*, *Fabr. sp. inf. I. p. 168. n. 39. mant. inf. I. p. 101. n. 51.*
Habitat in Angliae salice caprea, parvus.
- Rana. 145. *C. thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis: fasciis tribus undatis cinereis.* *Fabr. mant. inf. I. p. 101. n. 52.*
Habitat Kilonii, parvus, gibbus.
- paraple- 34. *C. cylindricus subcinereus, elytris mucronatis.* *Fn. suec. 604.** *Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 62. mant. inf. I. p. 103. n. 77.*
 cticus. *Fn. suec. 445. L. scan. 184.* *Curculio fuscus oblongus, elytris rectis acuminatis.*
Geoffr. inf. par. I. p. 279. *Curculio oblongus &c.*
Degeer inf. 5. p. 224. n. 18. t. 7. f. 8. *Curculio phellandrii.*
Schreber Samml. II. p. 336. t. 4.
Sulz. hist. inf. 2. 4. f. 7.
Schaeff. ic. t. 44. f. 1.
Habitat in Europae et Sibiriae umbellatis aquaticis, praesertim phellandrio, larva intra caulem, saepe sub aqua latente, et paraplegiae, ut fertur, apud equos causa, suis stercore antidoto.

- umbellatarum. 146. *C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mucronatis griseis. Fabr. mant. inf. I. p. 103. n. 78.*
Habitat in Barbariae umbellatis, statura fere paraplectici, at duplo fere minor.
- filiformis. 147. *C. cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis. Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 63. mant. inf. I. p. 103. n. 79.*
Habitat in Italia, statura paraplectici, at quadruplo minor.
- cylindricus. 148. *C. cylindricus supra niger, elytris acuminatis: fascia pallida. Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 64. mant. inf. I. p. 103. n. 80.*
Habitat in Sibiria, statura paraplectici, sed minor.
- notatus. 149. *C. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis: fascia lesqualtera testacea. Fabr. mant. inf. I. p. 103. n. 81.*
Habitat in Barbariae plantis, cylindricus.
- barbifrons. 150. *C. niger, rostro barbato, tibiis anterioribus tridentatis. Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 65. mant. inf. I. p. 104. n. 82.*
Seb. mus. 4. t. 95. f. 5.
Habitat in America australi, et India.
- angustatus. 151. *C. cylindricus ater, elytris obtusis punctatis. Fabr. sp. inf. I. p. 172. n. 66. mant. inf. I. p. 104. n. 83.*
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 71. n. 18. t. 24. f. 7.
Habitat rarior in Anglia.
- bardanae. 152. *C. cylindricus griseo tomentosus, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. I. p. 104. n. 84.*
Habitat Dresdae in artio lappa, statura et magnitudine paraplectici.
- anguinus. 35. *C. cylindricus canus, fusco lineatus.*
Habitat in Germania, statura paraplectici, subtus pedibusque canus nigro punctatus; rostro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici serie punctorum excavatorum minutissimorum ornatis, apice mucronatis.
- Afcanii. 36. *C. cylindricus ater, lateribus subcaerulefcentibus. Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 67. mant. inf. I. p. 104. n. 85.*
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 71. n. 19. t. 24. f. 8.
 (β) *Curculio cylindricus. Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 71. n. 20.*

Habitat in Europa australi, statura paraplectici, subtus canescens, elytris acutis. Alcanius.

lineola. 153. *C. cylindricus niger, elytris vitta, testacea. Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 68. mant. inf. I. p. 104. n. 86.*

Habitat in nova Hollandia.

linearis. 154. *C. elongatus niger, antennis pedibusque piccis, rostro basi attenuato. Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 69. mant. inf. I. p. 104. n. 87.*

Habitat Argentorati, rarior totus ferrugineus. Hermann.

crassipes. 155. *C. femoribus anterioribus subclavatis, corpore atro. Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 70. mant. inf. I. p. 104. n. 88.*

Habitat Argentorati. Hermann.

atriplicis. 156. *C. elongatus ater, thoraca nitido, elytris striatis obtusis. Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 71. mant. inf. I. p. 104. n. 89.*

Habitat in littoris Kilonienfis et Norwegici atriplice littorali.

Bacchus. 38. *C. cupreus, rostro plantisque nigris. Fabr. sp. inf. I. p. 165. n. 22. mant. inf. I. p. 99. n. 29.*

Geoffr. inf. par. I. p. 270. n. 4. Rhinomacer niger &c.

Sulz. hist. inf. t. 4. f. 4.

Schaeff. ic. t. 37. f. 13.

Habitat in Europae magis australis vite, corylo, supra subvillosus.

betulac. 39. *C. corpore viridi-aurato, subtus concolore. Fn. succ. 605.* Fabr. sp. inf. I. p. 165. n. 25. mant. inf. I. p. 99. n. 30.*

Degeer inf. 5. p. 248. n. 5. t. 7. f. 25. Curculio longirostris, antennis rectis nigris &c.

Geoffr. inf. par. I. p. 270. n. 2. Rhinomacer totus viridicaeruleus.

Frisch inf. 12. 17. t. 8. f. 2.

Sulz. hist. inf. t. 4. f. 5.

Schaeff. ic. t. 6. f. 4.

Habitat in betula alba, et frequentissimus in vite, folia contorquens, aliquando totus caeruleus, alterius sexus thorace atro, sum spinoso.

populi. 40. *C. corpore viridi ignito, subtus atro-caerulescente. Fn. succ. 606. Fabr. sp. inf. I. p. 166. n. 24. Fabr. mant. inf. I. p. 99. n. 31.*

Degeer

- Degeer inf. 5. p. 249. n. 37.* Curculio longirostris, antennis lectis nigris &c.
- Geoffr. inf. par. 1. p. 270. n. 3.* Rhinomacer viridi-aureus, subtus nigro-violaceus.
- Habitat in betula, populo, alterius sexus thorace antro-rsum spinoso.*
- bicolor. 157. C. niger, thorace elytrisque rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 166. n. 25. mant. inf. 1. p. 99. n. 32.*
Habitat in America.
- caeruleo-158. C. violaceus nitens, thorace elytrisque testacëis. *Schall. cephalus. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 282. Fabr. mant. inf. 1. p. 99. n. 33.*
Habitat in Saxoniae crataego, statura bicoloris.
- sturnus. 159. C. ovatus niger flavo-irroratus. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 286.*
Habitat Halæ Saxonum gregarius in urticis, c. jaceae affinis, c. pini magis ovatus.
- paullinus. 160. C. elytris thoraceque viridibus, rostro pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Ups. 4. p. 16. n. 27.*
Habitat Lutetis Parisiorum, pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.
- cylindroi-161. C. elongatus flavo irroratus, elytris punctatò-striatis des. apte obtusiusculis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 1.*
Habitat ad caput bonae spei, paraplectico affinis.
- poifer. 162. C. thorace subgloboso; spinulis brevioribus trifariis apice pectus, elytrisque nigricantibus albo-lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 38. n. 2.*
Habitat ad caput bonae spei, subtus cinereo-pubescent.
- caffer. 163. C. ateri thorace scabro, antennis, utrinque cicatrice notato, elytris punctato-striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. p. 39. n. 3.*
Habitat ad caput bonae spei, subtus griseo-pubescent, antennarum clava sericeo-argentea.
- armilla-164. C. thorace utrinque subspinoso, femoribus ad apicem cingulo griseo notatis, tibus fere omnibus dentatis. *Sparrm. tus. nov. act. Stockh. 1785. p. 40. n. 10.*

- α) Curculio totus ex fusco cinereus.
 β) Curculio elytris cinereo-nebulosis: maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.
Habitat ad caput bonae spei.

- ulicis. 165. C. cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus et femoribus primi paris rufis. *Forst. nov. inf. sp. 1. p. 31. n. 31.*
Habitat in Anglia, in floribus ulicis europaei, primo vere conspicuus, vix pediculi magnitudine.
- latus. 166. C. ater depressus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transversa, elytris sulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 71. n. 21. t. 24. f. 9.*
Habitat in Hungaria, c. Afcanii affinis.
- rumicis. 60. C. griseus nigro-nebulosus, antennis fuscis. *Fn. suec. 590. Fabr. sp. inf. 1. p. 170. n. 55. mant. inf. 1. p. 103. n. 73. Degeer inf. 5. p. 231. n. 20. t. 7. f. 10. II. R. j. inf. 85. n. 36.*
Habitat in Europae rumice.
- ungaricus. 167. C. niger, thorace elytrisque purpureis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 71. n. 22. t. 24. f. 10.*
Habitat in Hungaria, statura et magnitudine bacchi.
- cyanoccephalus. 168. C. niger villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris tubispadiceis punctato striatis, femoribus virescentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 72. n. 23. t. 24. f. 11.*
Habitat frequens in Marchiae betula, 2 lineas longus.
- striatus. 169. C. cinereo-pubescentis, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 72. n. 25. t. 24. f. 13.*
Habitat Berolini, rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.
- canus. 170. C. subglobosus cinereo-pubescentis, elytris abbreviatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 26. t. 24. f. 14. c.*
Habitat Berolini.
- cruciger. 171. C. nigerrimus, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo maculatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 27. t. 24. f. 15.*
Habitat Berolini, 2 circiter lineas longus.

- Grus. 172. C. niger, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato-striatis scabris, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 28.*
Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus.
- alauda. 173. C. cinereus, subglobosus thoracis dorso fascia transversa maculisque nigris, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*
Habitat in Pomerania.
- urticari- 174. C. fuscus: fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis.
us. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 30.*
Habitat in Pomerania, vix pulicis magnitudine.
- Punctum 175. C. nigerrimus, subtus et ad latera ochroleuco irroratus,
album. antennis fulvis, elytrorum sutura puncto medio albo.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.
*Habitat in nymphaeae luteae floribus, magnitudine et stru-
ctura c. scrophulariae.*
- albovitta- 176. C. flavo-cinereus, elytris vitta utrinque alba, rostro ni-
tus. gro. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 32.*
Habitat in Marchia.
- Lineola 177. C. convexus piceus, elytris striatis albo villosis: suturae
alba. linea alba abbreviata. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5.
p. 74. n. 33.*
Habitat in Marchia, pulicis magnitudine.
- verficol- 178. C. piceus albido-pubescentis, rostro nigro. *Herbst apud
lor. Fuessli arch. inf. 5. p. 75. n. 34.*
Habitat in Marchia, statura et magnitudine granari.
- melas. 179. C. angustus nigerrimus, tenuissime punctatus. *Herbst
apud Fuessli arch. inf. 7. p. 166. n. 94.*
Habitat in Austria, vix sesquilineam longus.
- rosarum. 180. C. subglobosus niger albido-pubescentis, elytris striatis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 167. n. 97.
Habitat Berolini, sesquilineam longus.
- quadri- 181. C. griseus, thorace lineis duabus, elytris punctis qua-
punctatus. tuor albis. *Lepechin it. 2. p. 204. t. II. f. 23.*
Habitat in Russia australi.

- varius. 182. *C. albo nigroque varius*, elytris apice acuminatis. *Lepeob. it. 2. p. 204. t. 11. f. 33.*
Habitat in Russia australi.
- piceus. 183. *C. piceus*, elytris abdomen aequantibus. *Pall. it. 1. app. n. 34. inf. mus. 1. p. 23. t. B. f. 3.*
Habitat in muria lacus Inderiensis, c. palmarum affinis, ac quadruplo minor.
- nomas. 184. *C. oblongus*, subtus albo-tomentosus, elytris canescens: striis punctato-tulcatis. *Pall. it. 1. app. n. 31.*
Habitat in Sibiria.
- piceus. 185. *C. oblongus ex nigro piceus*, antennis fuscis. *Degeer inf. 5. p. 221. n. 14.*
Habitat - - - 4½ lineam longus.
- gibbosus. 186. *C. ovatus niger*, elytris tuberculatis, posterioribus cinereis. *Degeer inf. 5. p. 224. n. 17.*
Habitat - - - 2½ lineam longus.
- castaneus. 187. *C. oblongus castaneus*, subtus niger, elytris striato-punctatis gibbosis. *Degeer inf. 5. p. 231. n. 19.*
Habitat - - - 3½ lineam longus.
- fasciatus. 188. *C. cinereus oblongus*, fasciis longitudinalibus dilutionibus. *Fr. succ. eth. 2. n. 2274. Degeer inf. 5. p. 234. n. 21.*
Habitat - - -
- naevius. 189. *C. ovatus griseus*, thorace fasciis, elytris macula magna punctisque fuscis. *Degeer inf. 5. p. 237. n. 24. t. 7. f. 17. 18.*
Habitat in plantagine; Julii sine frequens.
- rostratus. 190. *C. oblongus rufus*, capite elytrisque viridi-caeruleis nitidis. *Degeer inf. 5. p. 252. n. 42. t. 7. f. 27. 28.*
Habitat in Sueciac-hortis.
- melanocephalus. 191. *C. subglobosus fuscus*, capite rostroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inf. 5. p. 272. n. 6. t. 15. f. 27.*
Habitat Surinami, 4 lineas longus.
- fragile-gus. 192. *C. oblongus castaneus coleoptris thoracem aequantibus*; maculis quatuor rufis. *Degeer inf. 5. p. 273. n. 7.*
Habitat Surinami et in Oriente, parvus, fruges consumens.
193. *C.*

- pulverulentus. 193. *C. fuscus*, thorace granulato, elytris transversim rugosis.
Scop. ent. carn. n. 75.
Habitat in Carniola.
- centaureae. 194. *C. ovatus fuscus subrufo-villosus*, rostro deflexo marginato: linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn. n. 76.*
Habitat in centaureis.
- auratus. 195. *C. viridi-auratus*, antennis rostrique apice dilatato nigris. *Scop. ent. carn. n. 77.*
Habitat in Carniola.
- icosandriae. 196. *C. atro-caeruleus*, rostro porrecto, elytris octo-striatis.
Scop. ent. carn. n. 87.
Habitat in plantis icosandris.
- oleraceus. 197. *C. globosus nigricans*, elytris puncto lunulaque apicis albis. *Scop. ent. carn. n. 88.*
Habitat in Carniola.
- pellucens. 198. *C. flavicans*, oculis rostrique apice nigris. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 90. n. 41.*
Habitat circa Schemniz Hungariae, vix 2 lineas longus.
- gibbus. 199. *C. ovatus niger*, elytris violaceis fulcatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1014.*
Habitat in Dania.
- fimilis. 200. *C. ater*, elytris ovatis punctato-striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1015.*
Habitat in Dania.
- nemorialis. 201. *C. niger*, oculis fulcis, elytris punctato-striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1016.*
Habitat in Daniae nemoribus.
- politus. 202. *C. niger*, elytris cyaneis striatis nitidis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1017.*
Habitat in Dania.
- ochropus. 203. *C. niger ovatus*, femoribus ex flavo rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 90. n. 1018.*
Aët. Nidros. 4, 15.
Habitat in Scandinavia.
- griseus. 204. *C. oblongus cinereus*, antennis rufis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 974.*
Habitat in Dania.

- nitens. 205. *C. oblongus* ex nigro violaceus, thorace elytrisque ex nigro virentibus. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 975.*
Habitat in Dania.
- arvensis. 206. *C. griseus*, thorace trilineato, elytris rufis obscure tefellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 978.*
Habitat in Dania.
- tubercu- 207. *C. niger*, thorace rugoso, elytris lineis tuberculisque
latus. muricatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 88. n. 979.*
Habitat in Dania.
- glaucus. 208. *C. niger*, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis.
Müll. prodr. zool. dan. p. 88. n. 989.
Habitat in Dania.
- trifolii. 209. *C. niger*, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syst. nat.*
XII. 3. add. p. 224.
Habitat in trifolii montani spicis, intra quas declaratur,
pulicis magnitudine.
- longus. 210. *C. angustus elongatus niger*, thorace fasciis quatuor albi-
cantibus. *Geoffr. inf. par. I. p. 269. n. 1.*
Habitat in Gallia.
- fuligino- 211. *C. ex atro fuscus glaber punctato-striatus.* *Geoffr. inf.*
ius. *par. I. p. 271. n. 6.*
Habitat in Gallia.
- teres. 212. *C. ex nigro viridescens oblongus striatus.* *Geoffr. inf.*
par. I. p. 272. n. 7.
Habitat in Gallia.
- Pulex. 213. *C. subglobosus villosus niger*, pedibus elytrisque rufis.
Geoffr. inf. par. I. p. 272. n. 9.
Habitat in Gallia.
- rugosus. 214. *C. totus fuscus rugosus.* *Geoffr. inf. par. I. p. 278. n. 2.*
Habitat in Gallia.
- fulcatus. 215. *C. fusco-nebulosus*, thorace fulcato, elytris striatis.
Geoffr. inf. par. I. p. 278. n. 3.
Habitat in Gallia.
- carduelis. 216. *C. niger striatus*, maculis villoso-fuscis nebulosis. *Geoffr.*
inf. par. I. p. 281. n. 8.
Habitat in Galliae carduis.

- nape-
brassicæ. 217. *C. ex atro cinereus*, capite globofo, rostro elytrisque
nigris, antennis fuscis. *Bjerkander nov. act. Stockb.*
1780. 3. n. 4. p. 185.
Habitat in napobrassicæ caulibus, quos exedit, lineam lon-
gus, an hujus ordinis?
- erythro-
pus. 560. *C. griseus*, elytris striatis, rostro pedibusque nigris, ti-
biis apice incurvis plantisque rubris. *Mus. Lesk. p. 18.*
n. 385.
Habitat in Europa.
- chalybe-
us. 561. *C. glaber nigro-caerulefcens*, rostro arcuato, thorace
punctato, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 18. n. 388.*
Habitat in Europa.
- crenula-
tus. 562. *C. niger glaber*, rostro longitudine corporis, elytris stri-
tis: striis profunde crenatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 390.*
Habitat - - -
- foveola-
tus. 563. *C. viridi-aureus*, rostro pedibusque nigris, abdomine
violaceo elytris profunde punctatis, antennas inter ocu-
losque fovea oblonga. *Mus. Lesk. p. 19. n. 391.*
Habitat in Europa.
- virens. 564. *C. cylindricus viridis nitens*, rostro pedibusque cupreis.
Mus. Lesk. p. 19. n. 392.
Habitat in Europa.
- crassico-
nis. 565. *C. niger*, rostro compresso, antennis non fractis apice
crassioribus, thorace elytrisque levissime punctatis. *Mus.*
Lesk. p. 19. n. 393.
Habitat in Europa.
- glabratus. 566. *C. niger glaber*, elytris nigro-aeneis striatis. *Mus. Lesk.*
p. 19. n. 398.
Habitat in Europa, statura c. alliarum.
- atoma-
rius. 567. *C. fuscus*, elytris striatis: atomis griseis pilosis. *Mus.*
Lesk. p. 19. n. 399.
Habitat in Europa.
- striatulus. 568. *C. niger*, elytris sulcatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 400.*
Habitat in Europa, statura aterrimi.
- rugosus. 569. *C. fuscus*, elytris rugosis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk.*
p. 19. n. 405.
Habitat in Europa.

- crinitus. 570. *C. niger* globosus griseo pilosus, rostro glabro incurvo, elytris striatis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 407.*
Habitat in Europa.
- haeruatopu. 571. *C. niger*, thorace punctato, elytris striis crenatis, antennis tibiisque sanguineis. *Mus. Lesk. p. 19. n. 417.*
Habitat in Europa.
- †† femoribus posterioribus incrassatis, saltatorii.
- quercus. 25. *C. pallide flavus*, oculis nigris. *Fn. suec. 596.* Uddm. diss. 25.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 184. n. 126. mant. inf. 1. p. 110. n. 155.
Curculio (vininalis) longirostris, femoribus saltatorii, corpore testaceo.
Degeer inf. 5. p. 260. n. 48. t. 8. f. 5. Curculio ulmi.
Geoffr. inf. par. 1. p. 286. n. 19. Curculio rufus.
Reaumur inf. 3. 31. z. 3. f. 17. 18.
Habitat in Europae salicis, ulmi, quercus foliis, inter venas majores subcutaneus, folia maculans, magnitudine pediculi.
- multidentatus. 572. *C. rufus*, oculis nigris, pedibus posterioribus multidentatis. *Mus. Lesk. p. 20. n. 441.*
- meticulosus. 218. *C. griseo fuscus*, subtus elytrisque posterius albidus villosus, rostro inflexo nigro. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 40. n. 8.*
Habitat ad caput bonae spei.
- pudicus. 219. *C. pallide griseus*, rostro inflexo sanguineo, capite pedibusque rubicundis, elytris striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 40. n. 9.*
Habitat ad caput bonae spei.
- ilicis. 220. *C. nigricans*, elytris striatis cinereo variis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 110. n. 156.*
Habitat in Uplandiae quercu, parvus, statura c. quercus.
- Jota. 221. *C. ater*, elytris striatis, futura basi alba. *Fabr. mant. inf. 1. p. 110. n. 157.*
Habitat in Uplandia, parvus.
- alni. 42. *C. niger*, elytris testaceis: maculis duabus obscuris. *Fn. suec. 608.* Fabr. sp. inf. 1. p. 183. n. 123. mant. inf. 1. p. 110. n. 151.*

- Fn. suec. I. n. 473.* Curculio lividus, coleopteris maculis quatuor obscuris.
Geoffr. inf. par. I. p. 286. n. 20. Curculio rufus.
Degeer inf. 5. p. 262. n. 49. Curculio alni saltator.
Habitat in Europae alio.
- pilosus. 222. C. niger, cinereo variegatus. *Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 124. mant. inf. I. p. 110. n. 152.*
Habitat in Anglia, parvus.
- Calcar. 223. C. niger, femoribus unidentatis, antennis plantisque testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 110. n. 153.*
Habitat Kilomi, parvus.
- salicis. 43. C. elytris atis: fasciis duabus albis. *Fn. suec. 610.**
Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 125. mant. inf. I. p. 110. n. 154.
Degeer inf. 5. p. 264. n. 51.
Habitat in salicis floribus.
- fagi, 44. C. corpore atro, femoribus pallidis. *Fn. suec. 609. It. Jean. III. Scop. ent. carn. 73. Fabr. sp. inf. I. p. 184. n. 127. mant. inf. I. p. 110. n. 158.*
Habitat in fagi sylvaticae folus.
- vegetis. 45. C. corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. suec. 611.*
Habitat in agris super spitas.
- rhei. 279. C. ater opacus, thorace subpunctato, elytris punctato-friatis, subtus albido-pubescentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 78. n. 50.*
Habitat Berolini, sine rostro 3 lineas longus.
- rhamni. 280. C. ater opacus, rostro nitido, thorace grundato, elytris subfulcatis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 78. n. 51.*
Habitat in Marchia, absque rostro 4 lineas longus, c. rhei similis.
- curviro- 282. C. nigricans albido-pubescentis, thorace punctato, elytris
 tris. striatis, rostro incurvo, antennarum clavis fuscis. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 78. n. 53.*
Habitat in Marchia, 1½ lineam longus.
- Vanellus. 283. C. capite thoraceque subvillosa brevibus elytris striatis, pedibus fusciscentibus. *Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 79. n. 55. t. 24 f. 23. I.*
Habitat Berolini, vix lineam superans.

- arator. 284. *C. subovatus*, thorace fusco: lineis tribus pallidis, elytrorum futura nigro dentata, pedibus fuscis. *Mant. p. 531.*
Habitat - - - cimicis magnitudine.
- maricatus. 285. *C. ex fusco nigricans*, elytris verrucoso-striatis, femoribus unidentatis. *Drury inf. 2. t. 34. f. 4.*
- varicosus. 454. *C. elytris connatis fulcatis supra sextuberculatis, posterius bimucronatis.* *Pall. inf. Ross. I. p. 22. t. B. f. 1.*
Habitat in America meridionali, inter maximos congenerum, vaginali affinis, ater.
- rhynocheros. 455. *C. elytris connatis tuberculatis mucronatis, rostro basi bicorni.* *Pall. inf. Ross. I. p. 23. t. B. f. 2.*
Habitat in America, varicoso paulo brevior et latior.
- exesus. 456. *C. corpore nigro lutescente irrorato, thorace elytrisque maculis exesis albis.* *Pall. inf. Ross. I. p. 33. t. H. f. B. 15.*
Habitat Surinami, germano affinis, at major.
- danubialis. 478. *C. elytris cervinis: punctis nigris sparsis.*
Habitat in insulis danubialibus Viennensibus in corticibus arborum, 2 lineas longus.
- ††† femoribus dentatis.
- aterimus. 10. *C. ater*, elytris nitidis. *Fn. suec. 582.* Fabr. sp. inf. I. p. 179. n. 103. mant. inf. I. p. 108. n. 132.*
Habitat in Europae plantis frequentissimus, statura et magnitudine ocelliariae.
- cerasi. 11. *C. ater*, elytris opacis oblongis. *Fn. suec. 583. Scop. ent. carn. 84. Fabr. sp. inf. I. p. 179. n. 104. mant. inf. I. p. 108 n. 133.*
Geoffr. inf. par. I. p. 299. n. 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.
Frisch inf. II. 31. t. 23. f. 1. 3.
Habitat in cerasi pyrique foliis, epidermidem exedens, com-maculans, 1750 in Suecia frequentissimus.
- beccabungae. 41. *C. niger*, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inf. I. p. 108. n. 130.*
Syst. nat. XII. 2. p. 614. n. 41. Fn. suec. 607. Curculio fuscus, elytris subfanguineis; margine anoque fuscis?*
Habitat in Sueciae beccabunga, magnitudine et statura c. cerasi.

- Troglo- 224. C. thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testa-
dytes. ceis, pedibus fuscis. *Fabr. mant. inf. I. p. 108. n. 131.*
Habitat Kilonii, parvus.
- lapathi. 20. C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. *Fu.*
suéc. 591. Fabr. sp. inf. I. p. 176. n. 86. mant. inf. I. p.*
106 n. 109.
Degeer inf. 5. p. 223. n. 16. t. 7. f. I. 2. Curculio albi
caudis.
Habit. t in Europae salicibus et rumicibus, pectoris lateribus
elytrisque posterius albidis.
- irrorat- 225. C. albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco an-
tus. nularis. *Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 110.*
Habitat in Cayenna, statura et magnitudine C. lapathi.
- sexgutta- 226. C. niger, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf. I.*
tus. *p. 176. n. 87. mant. inf. I. p. 106. n. 111.*
Habitat in America.
- luridus. 227. C. ovatus obscure niger, elytris punctato-striatis. *Fabr.*
sp. inf. I. p. 176. n. 88. mant. inf. I. p. 106. n. 112.
Habitat in nova Hollandia.
- stolidus. 228. C. fuscus, tibiis posterioribus incurvis dentatis. *Fabr.*
sp. inf. I. p. 176. n. 89. mant. inf. I. p. 106. n. 113.
Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.
- medita- 229. C. elytris striatis, posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf. I.*
bundus. *p. 176. n. 90. mant. inf. I. p. 106. n. 114.*
Habitat in nova Hollandia.
- stupidus. 230. C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis.
Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 91. mant. inf. I. p. 107. n. 115.
Habitat in nova Hollandia.
- mangife- 231. C. griseus thorace linea punctisque duobus dorsalibus al-
rae. bis. *Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 92. mant. inf. I. p. 107.*
n. 116.
Habitat in mangiferae nucleis.
- stultus. 232. C. griseus, elytris macula communi lunata cinerea, rostro
atro. *Fabr. mant. inf. I. p. 107. n. 117.*
Habitat in Coromandel, c. mangiferae minor.

- squalidus. 233. *C. villoso-griseus*, rostro testaceo. *Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 93. mant. inf. I. p. 107. n. 118.*
Habitat Surinami, mediae magnitudinis.
- pomorum. 46. *C. femoribus anterioribus dentatis*, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec. 612.* Fabr. sp. inf. I. p. 181. n. 115. mant. inf. I. p. 109. n. 145.*
Frisch inf. I. p. 32. t. 8. Curculio in floribus arborum.
Habitat in pomonae floribus.
- ovalis. 47. *C. corpore ovato nigro albo maculato.* *Fn. suec. 613.*
Habitat in Europa.
- carbonarius. 48. *C. corpore nigro oblongo, clytris striatis.* *Fn. suec. 614. Scop. ent. carn. 29.*
Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 27. n. 47. t. 24. f. 21.
Habitat in Europa. Solander.
- mucronatus. 49. *C. femoribus quatuor anterioribus dentatis, clytris polline flavescens, supra apicem gibbosis.* *Mus. Lud. Utr. 53.* Gron. mus. 589.* Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 74. mant. inf. I. p. 104. n. 92.*
Habitat in America australi et India.
- jamaicensis. 234. *C. obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato, clytris striatis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 73. mant. inf. I. p. 104. n. 91.*
Habitat in America meridionali, magnus.
- bidens. 235. *C. niger, femoribus posterioribus dentatis, clytris unispinosis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 173. n. 72. mant. inf. I. p. 104. n. 90.*
Habitat in nova Seelandia.
- pufio. 50. *C. femoribus quatuor posterioribus dentatis, clytris striatis nigris: linea repanda grisea.* *Mus. Lud. Utr. 46.* Fabr. sp. inf. I. p. 174. n. 75. mant. inf. I. p. 104. n. 93.*
Habitat in America australi et India, elytrorum linea longitudinali.
- vaginalis. 51. *C. clytris striatis: tuberculis sparsis, juxta apicem mucronatis.* *Mus. Lud. Utr. 47.**
Habitat in America et Sibiria.
Pro rostro fossula in thorace; elytrorum striae ex punctis cavis villosis.

- spinipes. 236. *C. niger*, thorace lineis duabus, elytris striis quatuor albis, tibiis anterioribus spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 76. *mant. inf.* 1. p. 104. n. 94.
Habitat in insulis, Americae meridionali oppositis, magnus.
- Bombina. 237. *C. ferrugineo-fuscus*, elytris striatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 104. n. 95.
Habitat in Cayenna, magnus.
- Scorpio. 238. *C. ater*, thorace plano basi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 105. n. 96.
Habitat in Cayenna, magnus.
- Scaber. 239. *C. thorace carinato*, elytris fulcatis tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 77. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 97.
Habitat in Cayenna.
- trifasciatus. 240. *C. thorace linea laterali*, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 105. n. 98.
Habitat in Cayenna, testaceus c. abietis paulo major.
- cylindri- 241. *C. thorace scabro*, elytris posterioribus bituberculatis. *Fabr. roltris. sp. inf.* 1. p. 174. n. 78. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 99.
Habitat in nova-Hollandia.
- stigma. 52. *C. elytris macula magna ferruginea.* *Mus. Lud. Utr.* 48.*
Fabr. sp. inf. 1. p. 174. n. 79. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 100.
Habitat in America australi et India.
- hebes. 242. *C. femoribus subdentatis*, thorace scabro, elytris fulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 174. n. 80.
mant. inf. 1. p. 105. n. 101.
Habitat ad fluvium Senegal, mediae magnitudinis.
- depressus. 53. *C. thorace depresso*, lateribus obtuse angulatis. *Mus. Lud. Utr.* 49.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 181. n. 114. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 144.
Seb. mus. 4. t. 95. f. 4.
Habitat in America meridionali, griseus: punctis nigris glabris prominulis.
- annulatus. 54. *C. pallidus*, thorace elytrisque strigis nigris. *Mus. Lud. Utr.* 51.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 175. n. 81. *mant. inf.* 1. p. 105. n. 102.

Habitat

Habitat in America australi et India, thoracis striga una, elytrorum duabus.

caliginosus. 243. *C. elytrorum striis punctatis approximatis. Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 82. mant. inf. I. p. 105. n. 103. Habitat in Anglia, rarior.*

dubius. 244. *C. niger, thorace laevi, elytris striatis scabris. Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 104. Habitat - - - magnus.*

adpersus. 245. *C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. Fabr. mant. inf. I. p. 106. n. 105. Habitat in Cayenna, magnitudine et statura c. cynarae.*

brunneus. 246. *C. brunneus, rostro fusco, elytris testaceis punctato striatis. Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 83. mant. inf. I. p. 106. n. 106. Habitat ad caput bonae spei, magnus.*

abictis. 57. *C. elytris fuscis: fasciis duabus linearibus interruptis albidis. Fr. suec. 615.* Fabr. sp. inf. I. p. 175. n. 84. mant. inf. I. p. 106. n. 107. It. oel. 26. Curculio lufufuscus. Per. gazoph. 14. t. 8. f. 9. Curculio norwegicus. Degeer inf. 5. p. 205. n. 1. t. 6. f. 11. Schaeff. ic. t. 25. f. 1. Habitat in pini sylvestris cortice et resina; an alter sexus c. pini?*

reticulatus. 247. *C. oblongus piceus, elytris reticulatis: fasciis obliquis pallidis, tibis anterioribus spinosis. Fabr. sp. inf. I. p. 76. n. 85. mant. inf. I. p. 106. n. 108. Habitat Tranquebariae.*

germanus. 58. *C. ater, thorace utrinque punctis duobus testaceis. Fabr. sp. inf. I. p. 177. n. 94. mant. inf. I. p. 107. n. 119. Syst. nat. XII. 2. p. 613. n. 58. Curculio longirostris, femoribus subdentatis, corpore ovato nigro, punctis testaceis adperso. Scop. ann. hist. nat. 5. p. 91. n. 44. Sutz. hist. inf. 39. t. 4. f. 8. Schaeff. ic. t. 25. f. 2. Frisch inf. 13. p. 28. t. 26. Habitat in Europa; frequens in Germania, inter maximos europaeos.*

- nucum. 59. C. corpore griseo longitudine rostri. *Fr. succ.* 616. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 179. n. 156. *mant. inf.* 1. p. 108. n. 135. *Uddm. diss.* 24. Curculio ovatus griseus, rostro filiformi longitudine corporis. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 295. n. 42. *Degeer inf.* 5. p. 205. n. 2. t. 6. f. 14-16. *Roes. inf.* 3. t. 67. f. 5. 6. *Scop. ent. carn.* 105. *Podda inf. t.* 1. f. 3. *Schaeff. el. t.* 55. f. 1. *ic. t.* 50. f. 4. *Sulz. hist. inf. t.* 3. f. 22. *Habitat in coryli avellanae nucibus frequens.*
- proboscideus. 248. C. griseus, rostro corpore duplo longiore. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 107. *mant. inf.* 1. p. 108. n. 136. *Habitat in America boreali, an varietas c. nucum?*
- varians. 249. C. griseo nigroque varius, rostro pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 108. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 137. *Habitat in Cayenna.*
- ceraforum. 250. C. fuscus, scutello elytrorumque fasciis obsoletis cinereis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 109. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 138. *Habitat in Anglia, c. nucum triplo minor.*
- amoenus. 251. C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 110. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 139. *Habitat in nova Hollandia.*
- bicornis. 252. C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 111. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 140. *Habitat in nova Seelandia, ex fusco et cinereo varius.*
- tenuirostris. 253. C. niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 180. n. 112. *mant. inf.* 1. p. 109. n. 141. *Habitat in Anglia, statura c. ceraforum, at minor.*
- serophtariae. 61. C. coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. *Fr. succ.* 603. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 177. n. 95. *mant. inf.* 1. p. 107. n. 120. *Geoffr. inf. par.* 1. p. 296. n. 44. *Degeer inf.* 5. p. 208. n. 3. t. 6. f. 17-20.

List. scar. angl. p. 395. n. 35.

Reanmur. inf. 3. t. 2. f. 12.

Habitat in terophulariis, quarum pericarpia exedit larva, folliculos ovatos, operculatos, fuscis substituens.

- verbasci. 254. *C. niger*, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis
 * albis nigrisque alternis striatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 121.*
Habitat Kilonii, an varietas C. scrophulariae.
- gravis. 255. *C. niger*, elytris ferrugineo variis, femoribus canaliculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 96. mant. inf. 1. p. 107. n. 122.*
Habitat ad caput bonae spei.
- druparum. 62. *C. elytris testaceis, obsolete fasciatis. Fn. suec. 617. Fabr. sp. inf. 1. p. 181. n. 113. mant. inf. 1. p. 109. n. 142. Geoffr. inf. par. 1. p. 296. n. 43. Degeer inf. 5. p. 214. n. 7. Schaeff. ic. t. 1. f. 11. Sulz. hist. inf. t. 3. f. 21. Habitat in cerasi padi nucleis.*
- fraxini. 256. *C. fuscus*, femoribus ferrugineis, capite dorsoque nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 109. n. 143.*
Habitat in Sueciae fraxino, magnitudine c. druparum.
- violaceus. 63. *C. totus violaceus. Fn. suec. 579. Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 105. mant. inf. 1. p. 108. n. 134. Degeer inf. 5. p. 213. n. 5. Bergstr. nomencl. 1. 16. 13. t. 2. f. 13. Geoffr. inf. par. 1. p. 271. n. 5. Habitat in Europae pinetis, frequens in turionibus.*
- quinque-punctatus. 64. *C. elytris futura maculisque duabus albis. Fn. suec. 618. Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 97. mant. inf. 1. p. 107. n. 123. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 75. n. 40. t. 24. f. 18. g. Habitat in Europa boreali.*
- guttula. 257. *C. niger*, thorace tuberculato, elytris striatis: puncto posteriori albo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 107. n. 124.*
Habitat Halae Saxonum, parvus.
- didymus. 258. *C. supra fuscus*, elytris striatis: macula laterali transversa alba. *Fabr. sp. inf. 1. p. 178. n. 98. mant. inf. 1. p. 108. n. 125.*
Habitat in Germania, parvus.

- haemor- 259. C. thorace fusco lateribus cinerascens, elytrorum
rhoidalis. futura apice ferruginea. *Fabr. sp. inf. I. p. 178. n. 99.*
mant. inf. I. p. 108. n. 126.
Habitat in nova Hollandia.
- trimacu- 260. C. coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; posteriori
latus. communi lunata. *Fabr. sp. inf. I. p. 178. n. 100. mant.*
inf. I. p. 108. n. 127.
Habitat in Allatia et Suecia. Hermann et Pajkal.
- litura. 261. C. albo nigroque varius, rostro vario. *Fabr. sp. inf. I.*
p. 178. n. 101. mant. inf. I. p. 108. n. 128.
Habitat in Europa.
- villosus. 262. C. villosus griseus, scutello fasciaque elytrorum posteri-
ore albis. *Fabr. sp. inf. I. p. 178. n. 102. mant. inf. I.*
p. 108. n. 129. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 76.
n. 41. t. 24. f. 19.
Habitat in Germania.
- hispidus. 65. C. corpore fulcato, adperso squamis erectis. *Fn. suec. 619.**
Habitat in Europa.
- pedicula- 66. C. corpore rubro, elytris albedo subfasciatis. *Fn. suec. 620.**
rius. *Habitat in Europa.*
- Tortrix. 67. C. corpore testaceo, pectore fusco. *Fn. suec. 622.* Fabr.*
sp. inf. I. p. 181. n. 116. mant. inf. I. p. 109. n. 146.
Geoffr. inf. par. I. p. 300. n. 51.
Degeer inf. 5. p. 214. n. 16.
Habitat in populo tremula, folia contorquens.
- tremulae. 263. C. nigricans, elytris striatis griseo irroratis. *Fabr. mant.*
inf. I. p. 109. n. 147.
Habitat in Sueciae populo, statura et magnitudine tortricis.
- tacniatus. 264. C. thorace nigro: margine anteriore et posteriore rufis,
elytris pallidis nigro maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 181.*
n. 118. mant. inf. I. p. 109. n. 148.
Habitat in Anglia, tortrice minor.
- quadripu- 265. C. niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. sp.*
bulatus. *inf. I. p. 183. n. 121. mant. inf. I. p. 109. n. 149.*
Habitat ad caput bonae spei, statura brenti disparis.

- elongatus. 266. C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 183. n. 122. mant. inf. I. p. 110. n. 150.*
Habitat in Jamaica.
- byrrhinus. 267. C. thorace elytrisque nigris margine ferrugineis, pectore utrinque niveo: *Sparrm. nov. act. Stock. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 4.*
Habitat ad caput bonae spei, ater, ovatus.
- frigidifris. 268. C. thorace granulato, elytris punctato-friatis, rostro longitudinaliter utrinque sulcato. *Sparrm. nov. act. Stock. 1785. I. n. 4. p. 39. n. 5.*
Habitat ad caput bonae spei, nunc totus nigricans, nunc, praeter caput et thoracem, spadiceus.
- laniger. 269. C. elytris cicatrifato-reticulatis: posterioribus maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 6.*
Habitat ad caput bonae spei, supra niger, subtus rubicundolavuginosus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griseis.
- tibialis. 270. C. niger cinereo-nebulosus oblongus, thorace subgloboso, elytris friatis, rostro inflexo canali pectoris immerito, tibiis anterioribus intus barbatis. *Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 40. n. 7.*
Habitat ad caput bonae spei.
- glyphicus. 271. C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. *Schall. Abb. der. hall. Gef. Naturf. Fr. I. p. 282.*
Habitat Halae Saxonum, statura c. nucum, sed minor.
- capucinus. 272. C. elytris griseo-nebulosis, maculis posterioribus ad futuram oblongis punctisque binis albidis. *Schall. Abb. der hall. Naturf. Gef. I. p. 283.*
Habitat Halae Saxonum, magnitudine fere nebulosi, at magis ovatus.
- Forsteri. 273. C. manibus longissimis. *Forst. nov. inf. spec. I. p. 32. n. 32.*
Habitat in Anglia, oblongus, magnitudine c. pomorum, picus, pilis cinereis tomentosus, antennis tarsisque rufis, elytris cinereis nigro-punctatis.

- pollinari- 274. *C. elytris depressis planis abbreviatis, ventre, elytrorum
cus. margine et pedibus polline aspersis. Forst. nov ins. sp. 1.
p. 33. n. 33.
Habitat in Angliae plantis variis, praesertim urtica dioica,
supra planus fuscus.*
- cinnamo- 275. *C. cinnamomeus, rostro anterieus analiculato ad margi-
mi. nem denticulato: apice erecto mucronato bifurco, poste-
rius gibbo granulato. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5.
p. 76. n. 46. t. 24. f. 20. h. 1.
Habitat in India, 10 lineas longus; elytris punctato-stria-
tis: macula punctisque aurantiis; an brevis species?*
- affinis. 276. *C. niger, elytris caeruleis punctato striatis. Herbst apud
Fuesli arch. inf. 5. p. 77. n. 48.
Habitat Berolini, carbonarii statura et magnitudine.*
- glaber. 277. *C. ater nitidus, subtus punctatus. Herbst apud Fuesli
arch. inf. 5. p. 78. n. 49.
Habitat Berolini; 2 fere lineas longus.*
- denigra- 278. *C. ater, thorace punctato, elytris punctato striatis apice
tus. subtus rubicundis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 78.
n. 52.
Habitat in Marchia, sine rostro lineam longus, aterrimo
affinis.*
- cardui. 281. *C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato,
elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto scutelloque
flavis. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. p. 79. n. 54. t. 24.
f. 22. k.
Habitat Berolini in carduis.*
- ircos. 286. *C. totus candidus. Pall. it. 2. app. n. 57.
Habitat in Sibiriae iride, c. scrophulariae tripto major.*
- crucifer. 287. *C. fuscus, subtus ex flavo cinereus nitenti-tomentosus,
elytris ad futuram cruce notatis. Pall. it. 1. app. n. 35.
Habitat in Sibiria, c. scrophulariae magnitudine.*
- albicans. 288. *C. thorace tuberculis quinque, elytris sex, ano albo.
Lepech. it. 2. p. 206. t. 10. f. 6.
Habitat in Russia.*
- urticae. 289. *C. niger planiusculus, thorace utrinque dentato, ely-
tris striatis posterius bipunctatis. Müll. zool. dan. prodr.
p. 88. n. 983.
Habitat in urticis.*

- rufus. 290. *C. subglobosus* rufus, elytrorum lineis elevatis albo nigroque tessellatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 89. n. 998.*
Habitat in Dania, c. scrophulariae affinis.
- tuberculolus. 291. *C. niger*, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum seriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n. 80.*
Habitat in Carniolla.
- cariosus. 292. *C. oblongus*, rostro nitidulo, elytris striatis, femoribus anterioribus crassioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n. 81.*
Habitat in Carniolla.
- lyngensiae. 293. *C. cervinus*, brevissime villosus; rostro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n. 82.*
Habitat in Carniollae lyngensiae.
- fuscus. 294. *C. fuscus*, scutello puncto albo, elytris macula rubescente notatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 300. n. 50.*
Habitat in Gallia.
- Geerii. 295. *C. subglobosus* griseus, coleoptris macula magna fusca dorsali. *Degeer inf. 5. p. 212. n. 4.*
Habitat in fraxino.
- ulmi. 296. *C. oblongus* ex rufo fuscus, proboscide nigra, elytris macula nigricante. *Degeer inf. 5. p. 215. n. 8. t. 6. f. 26. 27.*
Habitat in ulmo.
- pulverulentus. 297. *C. oblongus* niger, elytris cinereo maculatis. *Degeer inf. 5. p. 268. n. 3. t. 15. f. 24.*
Habitat Surinami.
- frigidus. 548. *C. fuscus*, elytris striatis subtuberculatis ferrugineo variis. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*
Habitat in Amboina, mediae magnitudinis.
- bohemus. 552. *C. elytris* griseis punctatis, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abb. der boehm. Gef. 4. p. 183.*
Habitat in Bohemiae pomariis, pulicis magnitudine, celeritate currens.
- reticulatus. 573. *C. oblongus* niger, elytris profunde punctatis reticulatisque: rugis transverse levissime striatis. *Mus. Lesk. p. 20. n. 423.*
Habitat in Europa.

- subfascia- 574. *C. ferrugineus*, elytris fulvo obsolete fasciatis. *Musf.*
tus. *Lesk. p. 20. n. 426.*
Habitat in Europa.
- tricolor. 575. *C. testaceus*, capite, thorace pedibusque rufis, elytris
fasciis duabus dentatis ferrugineis. *Musf. Lesk. p. 20.*
n. 427.
Habitat in Europa.
- dentatus. 576. *C. rufus*, femoribus dente valido armatis. *Musf. Lesk.*
p. 20. n. 431.
Habitat in Europa.
- acutus. 577. *C. rufus*, elytris striatis, femoribus acute dentatis. *Musf.*
Lesk. p. 20. n. 432.
Habitat in Europa, an satis distincta species?
- cineraf- 578. *C. niger* subtus cinerascens, elytris striatis, rostro lon-
cens. gitudine corporis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 434.*
Habitat in Europa.
- murica- 579. *C. subglobosus niger*, elytris fulcatis pilosis cinereis, po-
tus. sterius muricatis, tibiis tarsisque rufis. *Musf. Lesk. p. 20.*
n. 435.
Habitat in Europa.
- cinereus. 580. *C. subglobosus cinereus*, antennis pedibusque rufescenti-
bus. *Musf. Lesk. p. 20. n. 436.*
Habitat in Europa.
- bipuncta. 581. *C. subglobosus cinereus*, thorace griseo: anterieus tuber-
tus. culis quatuor, elytris striatis: singulorum disco punctis
duobus griseis. *Musf. Lesk. p. 20. n. 439.*
Habitat in Europa.
- Daviesii. 601. *C. albido griseus*, elytris anterieus angulatis: macula ma-
gna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh. 8. 1787.*
3. n. 3. 13. t. 8. f. 5.
Habitat in Noveboraco, c. nucum duplo fere major.
- zonatus. 602. *C. niger*, thorace lateribus elytrisque fasciis tribus distin-
ctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh. 1787. 8. n. 3. 14.*
Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis, sub-
ovatus.

** *Brevirostres.*† *femoribus dentatis.*

- spectabilis. 298. C. corpore viridi nigroque variegato. *Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 208. mant. inf. I. p. 121. n. 269.*
Habitat in nova Hollandia.
- pinguis. 299. C. gibbus nigricans, femoribus posterioribus muticis, thorace lineis, elytris strigis duabus lineaque apicis flavescens. *Fabr. mant. inf. I. p. 121. n. 270.*
Habitat in Cayenna, magnus.
- tridens. 300. C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 122. n. 271.*
Habitat in nova Seelandia, magnus.
- fusco-maculatus. 301. C. ater, femoribus subdentatis, thorace elytrisque laevibus fusco maculatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 122. n. 272.*
Habitat in Germania, magnus, laevis.
- ligustici. 68. C. abdomine subovato murino. *Fn. suec. 621.*
Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 209. mant. inf. I. p. 122. n. 273.
Curculio brevirostris femoribus dentatis, corpore obscuro.
Degeer inf. 5. p. 218. n. 10. Curculio apterus antennis fractis &c.
Schaeff. ic. t. 2. f. 12.
Bonsd. curc. Suec. 2. f. 33.
Habitat in ligustico levitico.
- nubilus. 302. C. griseus, elytris punctis obscurioribus numerosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 210. mant. inf. I. p. 122. n. 274.*
Habitat Hamburgi.
- nigrita. 303. C. niger obscurus, thorace scabro, elytris crenato-striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 211. mant. inf. I. p. 122. n. 275.*
Habitat in Italia, statura et magnitudine sulcati.
- sulcatus. 304. C. ater, elytris striatis ferrugineo maculatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 212. mant. inf. I. p. 122. n. 276. Bonsd. curc. Suec. 2. f. 35.*
Herbst apud Fuesli. arch. inf. 5. p. 85. n. 86. t. 24. f. 35?
Habitat in Saxoniae nemoribus.

- gemmat.
tus. 305. *C. ater*, elytris punctis viridibus. *Fabr. sp. inf. I. p. 197, n. 213. mant. inf. I. p. 122. n. 277. Scop. ent. carn. n. 90. Schulze Naturf. 6. t. 4. Habitat in Europa.*
- picipes. 306. *C. griseus*, elytris nebulosis, femoribus posterioribus rufis. *Fabr. sp. inf. I. p. 197. n. 214. mant. inf. 3. p. 122. n. 278. Habitat in Kilonii plantis. Elytra punctis subocularibus striata.*
- ovatus. 69. *C. abdomine ovato nigro, pedibus antennisque rufis. Fu succ. 626.* Fabr. sp. inf. I. p. 191. n. 221. mant. inf. I. p. 123. n. 287. Bond. curc. succ. 2. f. 26. Degeer inf. 5. p. 219. n. 11. Curculio rosae. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 85. n. 90. t. 24. f. 36. Habitat in Europae pomona.*
- attelaboides. 307. *C. rostro elytrisque unituberculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 191. n. 222. mant. inf. I. p. 123. n. 288. Habitat in Brasilla.*
- oblongus. 71. *C. antennis, elytris pedibusque ferrugineis. Fu succ. 625.* Fabr. sp. inf. I. p. 199. n. 220. mant. inf. I. p. 123. n. 286. Geoffr. inf. par. I. p. 294. n. 39. Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis. Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 168. n. 102. t. 45. f. 9. e. f. Habitat in Europa.*
- pyri. 72. *C. aeneo-fuscus. Fu succ. 623.* Fabr. sp. inf. I. p. 198. n. 217. mant. inf. I. p. 122. n. 281. It. fan. 355. Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis. Geoffr. inf. par. I. p. 282. Curculio squamoso-viridis &c. Degeer inf. 5. p. 246. n. 34. Schaeff. ic t. 2. f. 11. Sulz. hist. inf. t. 3. f. 23. Habitat in pyri foliis larva, in hujus prunique corollis imago.*
- mali. 308. *C. subpubescens fuscus, femoribus acute dentatis, antennis pedibusque testaceis. Fabr. sp. inf. 2. app. p. 499. mant. inf. I. p. 122. n. 282. Lesk. it. p. 47. t. A. f. 13. Habitat Lipsiae, c. pyri proxime affinis. Leske.*

- arboresci. 309. *C. cinereus*, femoribus anterioribus dentatis, elytris punctatò striatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 122. n. 283.*
Habitat in Cayenna, argentati magnitudine et statura.
- argentatus. 73. *C. corpore viridi-argenteo.* *Fn. succ. 624.* Scop. ent. carn. 91. Fabr. sp. inf. I. p. 198. n. 218. mant. inf. I. p. 123. n. 284. Bousd. curc. Suec. 2. f. 12.*
Fn. succ. 459. Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.
Geoffr. inf. par. I. p. 293. n. 38. Curculio squamosus viridi-auratus.
Deger inf. 5. p. 219. n. 12. Curculio urticae.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 9.
Habitat in Europae urtica, betula, corylo, quercu.
- viridanus. 310. *C. viridis*, orè antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. sp. inf. I. p. 198. n. 219. mant. inf. I. p. 123. n. 285.*
Habitat Traquebariae.
- Morio. 311. *C. ater nitens elytris glabris.* *Fabr. sp. inf. I. p. 198. n. 215. mant. inf. I. p. 122. n. 279. Bousd. curc. Suec. 2. f. 29.*
Habitat in Germania, et Succia magnus.
- bifulcatus. 312. *C. niger*, coleopterorum limbo cinereo, rostro bifulcato. *Fabr. sp. inf. I. p. 198. n. 216. mant. inf. I. p. 122. n. 280.*
Habitat in Italia, statura fulcati.
- aeruginosus. 313. *C. oblongus totus viridis, femoribus ferrugineis, antennis longioribus.* *Bousd. hist. curc. 2. p. 23. n. 7. f. 8.*
Habitat in Suecia, statura magis oblonga et antennis longioribus a c. pyri distinctus.
- erythropus. 315. *C. oblongo ovatus niger, antennis longioribus pedibusque rufis.* *Bousd. curc. 2. p. 25. n. 10. f. 10.*
Stroem act. Hafn. 2. p. 57. n. 28. 29. Curculio falicis et dubius.
Habitat in Scandinaviae herbidis, frequentior; an a rufipede satis distinctus, cum femora non semper dentata.
- tesellatus. 316. *C. ovatus niger, elytris striatis: striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis.* *Bousd. curc. 2. p. 38. n. 31. f. 32. Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 967.*
Habitat in Scandinavia, punctatulo affinis.

- floricola. 317. *C. niger*, elytris incanis, antennarum articulis mediis spadiceis. *Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 86. n. 93.*
Habitat - - - 3 lineas longus, c. pyri affinis.
- Fallo. 318. *C. elytris nigris albo punctatis.* *Schranck enum. inf. Austr. p. 116. n. 221. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 86. n. 91. t. 24. f. 37.*
Habitat in Austriae plantis variis, praesertim arboribus, niger, 3½ lineas longus.
- anthracinus. 319. *C. niger*, elytris punctatim striatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n. 92.*
Habitat in Carnioliâ.
- lugubris. 320. *C. fuscus*, elytris punctis scabris substriatis villosulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n. 93.*
Habitat in Carnioliâ.
- infidus. 321. *C. obsolete cupreus, caerulefcenti-villosus.* *Scop. ent. carn. n. 94.*
Habitat in Carnioliâ.
- pruni. 322. *C. niger subvillosus, antennis, elytris pedibusque rufis.* *Scop. ent. carn. n. 95.*
Habitat in Carnioliâ.
- caelestinus. 323. *C. caeruleus, antennis pedibusque fanguineis.* *Scop. ent. carn. n. 96.*
Habitat in Germania.
- carniolicus. 324. *C. fuscus, glaucescenti-villosus, elytris sparsim punctatis.* *Scop. ent. carn. n. 97.*
Habitat in Carnioliâ.
- Scopolii. 325. *C. fuscus villosulus, antennis pedibusque rufis.* *Scop. ent. carn. n. 98.*
Habitat in Carnioliâ; an distinctus ab ovato?
- Roefelii. 326. *C. thorace obscure viridi: linea longitudinali alba, elytris fusco-fulvis lineis elevatis sulcatis.* *Roef. inf. 3. p. 391. t. 67. f. A. B. C. D.*
Habitat in Germania, rostro crasso.
- Mülleri. 327. *C. niger, elytris substriatis, oculis rufis.* *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 963.*
Habitat in Daniae levistico.

- danicus. 322. *C. ater*, elytris subfulcatis pallide punctatis, oculis ruffis.
Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 964.
Habitat in Dania.
- squamifer. 323. *C. oblongus*, elytris griseo nigroque striatis. *Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 968.*
Habitat in Dania.
- austriacus. 324. *C. cinereus apterus*, elytris lineis albidis nigro-punctatis. *Schranck inf. Austr. p. 117. n. 222.*
Habitat in Austria.
- religiosus. 325. *C. ater nitens*, elytris albo maculatis. *Schranck inf. Austr. p. 118 n. 225.*
Habitat in monte Austriae Oetfcher ad cellas Marianas, 4 lineas longus, habitu germani.
- coronatus. 326. *C. niger apterus*, thorace utrinque puncto duplici fulvo: basi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inf. par. I. p. 291. n. 34.*
Habitat in Gallia.
- Tigris. 327. *C. niger*, maculis flavo-villosis, elytris subrugosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 292, n. 35.*
Habitat in Gallia.
- corrugatus. 328. *C. fuscus apterus*, elytris rugoso-striatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 293. n. 37.*
Habitat in Gallia.
- geographicus. 329. *C. subglobosus ex nigro fuscus*, squamosus, lineolis albis variis. *Geoffr. inf. par. I. p. 294. n. 40.*
Habitat in Gallia.
- facialis. 330. *C. fuscus*, elytris striatis: macularum albarum fascia triplici transversa. *Geoffr. inf. par. I. p. 295. n. 41.*
Habitat in Gallia.
- albo-punctatus. 331. *C. subglobosus squamosus ex cinereo fuscus*, elytrorum maculis tribus et apice albis. *Geoffr. inf. par. I. p. 299, n. 47.*
Habitat in Gallia.
- fericeus. 332. *C. obscure rufus cinereo-villosus*, rostro thorace brevior. *Geoffr. inf. par. I. p. 300. n. 52.*
Habitat in Gallia.
- Virgo. 333. *C. oblongus cinereo-villosus*, rostro thoraci aequali. *Geoffr. inf. par. I. p. 301. n. 53.*
Habitat in Gallia.

- stritos. 334. *C. oblongus niger flavescens-punctatus, antennis longis fractis.* Degeer *insf.* 5. p. 217. n. 9.
Habitat - - - 2 lineas longus.
- granulofus. 601. *C. niger, thorace varioloso, elytris punctis elevatis rugosis interstitiorum punctis minoribus.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 490.
Habitat in Europa.
- leprofus. 602. *C. villosus ferrugineus albido-maculatus, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-friatis.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 491.
Habitat in Europa.
- fulcatus. 603. *C. fuscus thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis; rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 492.
Habitat in Europa.
- chrysoctos. 604. *C. fuscus glaber, thorace punctato, elytrorum sulcis cretatis maculisque tribus auro conspersis, antennis ferrugineis.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 493.
Habitat in Europa.
- argentatus. 605. *C. viridi-argenteus, antennis tibiisque rufis, femoribus fuscis clavatis.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 500.
Habitat in Europa.
- haemorrhous. 606. *C. fuscus, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fusco virescentibus.* *Mus. Lesk.* p. 23. n. 501.
Habitat in Europa.
†† femoribus muticis.
- polygōni. 26. *C. thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuscis futuraque nigro-punctata.* *Fabr. sp. insf.* I. p. 188. n. 151. *mant. insf.* I. p. 116. n. 200.
Syst. nat. XII. 2. p. 609. n. 26. *Fn. suec.* 597. *Curculio longirostris testaceus, coleopterorum futura nigra repanda.*
Habitat in Europae polygono, mediae magnitudinis.
- griseus. 335. *C. supra griseo fuscus, subtus cinereus, rostro canaliculato.* *Fabr. sp. insf.* I. p. 188. n. 152. *mant. insf.* I. p. 116. n. 201.
Habitat in Anglia.

- triguttatus. 336. *C. nigricans*, elytris griseis: maculis duabus albis, posteriori majori communi. *Fabr. sp. inf. 1. p. 188. n. 153. mant. inf. 1. p. 116. n. 202.*
Subz. hist. inf. t. 4. f. 11.
Habitat in Anglia.
- geminatus. 337. *C. cinereus*, thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per spatia approximatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 203.*
Habitat Kilonii, mediae magnitudinis, fere globosus.
- diadema. 338. *C. flavescens-villosus*, rostro apice retulo atro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 116. n. 204.*
Habitat in Cayenna, statura c. coryli, at paulo major.
- coryli. 339. *C. cinereus* fuscoque varius, elytrorum sutura dimidiata atra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 189. n. 154. mant. inf. 1. p. 116. n. 205.*
Habitat in Angliae corylo.
- Spengleri. 32. *C. fuscus*, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inaequalibus, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. p. 174. mant. inf. 1. p. 118. n. 229. Herbst Besch. der berl. Naturf. Fr. 4. t. 7. f. 7.*
Habitat in America, statura c. pini.
- vittatus. 33. *C. ater*, elytris striis albis rubisque abbreviatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 173. mant. inf. 1. p. 118. n. 228.*
Syst. nar. XII. 2. p. 610. n. 33. Curculio longirostris, elytris lineis albis luteisque.
Sloan. jam. 2. p. 210. Scarabaeus Curculio.
Habitat in America meridionali, insulisque oppositis.
- bivittatus. 340. *C. niger*, elytris punctato striatis: vitta marginali dorsaliq; interrupta flavis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 118. n. 230.*
Habitat in insula S. Thomae, statura c. Spengleri.
- lividus. 341. *C. griseus*, thorace elytrisq; cinereo atroque maculatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 191. n. 175. mant. inf. 1. p. 118. n. 231.*
Brown illustr. 129. t. 49. f. 8.
Habitat in America meridionali, magnus.
- pulcher. 342. *C. colcoptis* atris: striis sex dorsalibus approximatis abbreviatis albis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 176. mant. inf. 1. p. 118. n. 232.*
Brown illustr. 126. t. 49. f. 6.
Habitat in Jamaica, statura vittati.

- bistrioni- 343. *C. griseus*, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis :
cus. maculis atris fulvisque. *Fabr. sp. inf. I. p. 192. n. 177.*
mant. inf. I. p. 118. n. 233. Sparrm. nov. act. Stockb.
1785. I. p. 44. n. 17. t. 2.
Habitat ad caput bonae spei.
- Rohrii. 344. *C. elytris acuminatis griseis: baseos margine flavescente.*
Fabr. sp. inf. I. p. 192. n. 178. mant. inf. I. p. 118. n. 234.
Habitat in insulis, Americae oppositis. - v. Rohr.
- impressus. 345. *C. niger*, thorace elytrisque punctis impressis albis. *Fabr.*
sp. inf. I. p. 192. n. 179. mant. inf. I. p. 118. n. 235.
Habitat in Jamaica, statura pulchri.
- cervinus. 70. *C. griseus*, antennis basi rufescentibus. *Fn. succ. 627.*
Fabr. sp. inf. I. p. 190. n. 160. mant. inf. I. p. 117. n. 213.
Bonsd. curc. Succ. 2. f. 15.
Degeer inf. 5. p. 220. n. 13. Curculio griseo-aeneus.
Habitat in Europa, femoribus interdum dentatis.
- striatus. 346. *C. fuscus*, elytris striis cinereis nigro-punctatis. *Fabr.*
mant. inf. I. p. 117. n. 214.
Habitat in Africa, parvus.
- Lacerta. 347. *C. griseus*, elytris striatis, antennis apice nigris. *Fabr.*
sp. inf. I. p. 117. n. 214. mant. inf. I. p. 117. n. 215.
Habitat in India, statura cervini, at triplo major.
- velox. 348. *C. pilosus niger*, elytris margine, puncto baseos, fascia
interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inf. I.*
p. 117. n. 216.
Habitat in Cayenna, parvus.
- argyreus. 74. *C. femoribus submuticis, corpore toto viridi argenteo au-*
reoque maculato. Mus. Lud. Ulr. 54. Fabr. sp. inf. I.*
p. 184. n. 128. mant. inf. I. p. 110. n. 159.
Habitat in America australi et India, facie argentati, fe-
moribus primoribus spina obsoleta armatis.
- imperia- 349. *C. elytris striis elevatis atris fulcisque punctatis viridi-*
lis. aureis alternis, basi gibbis apice acuminatis. *Fabr. sp.*
inf. I. p. 184. n. 129. mant. inf. I. p. 110. n. 160.
Drury inf. 2. t. 33. f. 1.
Lindenberg Naturf. X. p. 86. n. 4. t. 2. f. 1.
Habitat in America meridionali, maximus, insectorum fa-
cile pulcherrimum.

- regalis. 75. C. corpore viridi-fericeo; fasciis aureis repandis: *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 130. mant. inf. I. p. 111. n. 161.*
Habitat in America meridionali, magnitudine et statura germanici, femoribus fuscis; annulo aureo.
- margina- 350. C. fuscus, elytrorum futura abdominisque marginibus
 tus. aureis. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 131. mant. inf. I. p. 111. n. 162.*
Habitat in America.
- 19puncta- 351. C. canescens, thorace punctis nigris quatuor, coléoptris
 tus. novendecim. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 132. mant. inf. I. p. 111. n. 163.*
Habitat in Cayenna.
- viridis. 76. C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. *Fabr. sp. inf. I. p. 186. n. 139. mant. inf. I. p. 112. n. 175.*
Bonsd. curc. Suec. 2. f. 7.
Syst. nat. XII. 2. p. 616. n. 76. Curculio brevirostris, femoribus muticis, corpore viridi supra obscuro, subtus flavidiore.
Degeer inf. 5. p. 256. n. 45. Curculio flavo-cinctus.
Sulz. hist. inf. t. 3. f. 24.
Schaeff. elem. t. 108.
icon. t. 53. f. 6.
Habitat in Europae pomona, magnitudine et statura c. pyri, antennis pedibusque nigris.
- gibber. 352. C. virescenti-âlbis, elytris basi unidentatis posterius gibbosis. *Pall. ic. inf. Russ. I. p. 32. t. B. f. 14. Fabr. mant. inf. I. p. 112. n. 176.*
Habitat in Cayenna.
- fulvus. 353. C. fulvus, capitis basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. *Fabr. mant. inf. I. p. 113. n. 177.*
Habitat in Saxonia, parvus.
- palliatu. 354. C. fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Fabr. mant. inf. I. p. 113. n. 178.*
Habitat in Germania, statura viridis, at paulo minor.
- aurifer. 355. C. corpore ferrugineo auro maculato. *Fabr. sp. inf. I. p. 186. n. 140. mant. inf. I. p. 113. n. 179.*
Drury inf. I. t. 32. f. 1.
Habitat in America, pedibus anterioribus elongatis.

- cyanipes. 356. *C. albus*, elytris vitta abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 180.*
Habitat in Cayenna, aurentis fuscis cyaneo nitidis.
- tamarisci. 357. *C. viridi-nitens*, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereoque variis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 181.*
Habitat in Africae tamarisco, statura splendiduli, at duplo fere major.
- splendidulus. 358. *C. viridi-nitens*, coleopterorum disco cinereo, cupreo nigroque fasciato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 186. n. 141. mant. inf. 1. p. 113. n. 182.*
Habitat in Sibiria, statura argentati, at minor.
- curvipes. 359. *C. argenteo squamosus*, tibiis posterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 113. n. 183.*
Habitat in India, mediae magnitudinis.
- speciosus. 77. *C. corpore luteo viridi-nitente*, elytris spinis sparsis. *Mus. Lud. Ulr. 55.**
Habitat in America australi et India, spinis elytri utriusque 5.
- ruficornis. 78. *C. corpore atro*, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris. *Fu. succ. 636.* Fabr. sp. inf. 1. p. 190. n. 162. mant. inf. 1. p. 117. n. 217. Bousd. curc. Suec. 2. f. 13.*
Habitat in Europa.
- albinus. 79. *C. niger*, frontè anoque albis, thorace tuberculato. *Fu. succ. 632. Scop. ent. carn. 66. Fabr. sp. inf. 1. p. 192. n. 180. mant. inf. 1. p. 118. n. 236. Bousd. curc. Suec. 2. f. 1.*
Degeer inf. 5. p. 255. n. 44. t. 8. f. 1. Curculio brevitris, antennis longis rubris &c.
Uddm. diff. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum sex.
Habitat in Europa, magis boreali, colore c. lapathi referens.
- latirostris. 360. *C. rostro latissimo plano*, elytris apice albis punctis dubus nigris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 193. n. 181. mant. inf. 1. p. 118. n. 237. Bousd. curc. Suec. 2. f. 2. 3.*
Sulz. hist. inf. t. 2. f. 17. Silpha oblonga.
Geoffr. inf. par. 1. t. 5. f. 2.
Schaeff. ic. t. 89. f. 6.
Habitat in Europa, antennarum annulo rubro.

- albifrons. 361. C. rostro latissimo plano elytrisque posterius albis nigre variis. *Schall. Abb. d. hall. Naturf. Ges. I. p. 287. Fabr. mant. inf. I. p. 119. n. 238.*
Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 80. n. 66. t. 24. f. 26. m.
Habitat in Germaniae inferioris betula, latirostri dupla major.
- planifrons. 362. C. nigro aeneus, rostro latissimo plano pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 119. n. 239.*
Habitat Kiloni, parvus.
- marginellus. 363. C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. *Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 182. mant. inf. I. p. 119. n. 240.*
Habitat in Africa aequinoctiali statura verrucosi, at minor.
- lineatus. 80. C. fuscus, thorace striis tribus pallidioribus. *Fn. Suec. 630.**
Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 155. mant. inf. I. p. 116. n. 206. Bousd. curc. Suec. 2 f. 16. 17.
Degeer inf. 5. p. 247. n. 35. Curculio brevirostri, antennis fractis &c.
Geoffr. inf. par. I. p. 283. Curculio rostro thoracis longitudine &c.
Schaeff. ic. t. 103. f. 8.
Habitat in Europae salice putrida, plantisque variis.
- lunatus. 364. C. coleoptis elevato-striatis: fascia semicirculari maculaque posteriore albis; lunula nigra. *Fabr. sp. inf. I. p. 189 n. 156. mant. inf. I. p. 116. n. 207.*
Habitat in Anglia.
- fulvipes. 365. C. tomentoso-virescens, pedibus testaceis. *Fabr. mant. inf. I. p. 116. n. 208.*
Habitat Halae Saxonum, statura parva lineati.
- ruficollis. 366. C. testaceus, capite elytrisque striatis cinereo-fuscis. *Fabr. mant. inf. I. p. 116. n. 209.*
Habitat Halae Saxonum, parvus.
- undatus. 367. C. fuscus, elytris apice pallidis: striga undata fusca. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 157. mant. inf. I. p. 117. n. 210.*
Habitat in Germania, parvus, statura lunulati.
- hispidulus. 368. C. fuscus, thorace cinereo lineato, elytris hispidis: punctis obscurioribus striatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n. 158. mant. inf. I. p. 117. n. 211.*
Habitat Kiloni in plantis aquaticis.

- scabricu- 369. C. corpore cinereo hispido. *Fabr. sp. inf. I. p. 189. n.*
 lus. 158. *mant. inf. I. p. 117. n. 212.*
Bousd. curc. Suec. 2. f. 21.
Mant. p. 531. Curculio brevirostris femoribus muticis, cinereus, elytris hispidis.
Habitat in Sueciæ arenosis.
- incanus. 81. C. oblongus fuscus, thoracis dorso plano. *Fabr. sp. inf.*
 I. p. 187. n. 147. *mant. inf. I. p. 115. n. 193. Bousd.*
curc. Suec. 2. f. 37. Herbst apud Fuesli arch. inf. 5. t.
 24. f. 24.
Syst. nat. XII. 2. p. 616. n. 81. Fn. suec. 631. Curculio*
brevirostris cinereus oblongus, elytris obtusiusculis.
Geoffr. inf. par. I. p. 282. n. 10. Curculio cinereo squa-
mosus &c.
Degeer inf. 5. p. 242. n. 28. Curculio griseo apterus.
List. scar. angl. p. 394. n. 30.
Habitat in Europæ pinetis.
- collatus. 370. C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. *Fabr.*
mant. inf. I. p. 115. n. 194.
Habitat in Gallia australi, magnitudine incani.
- interru- 371. C. obscurus, coléoptrorum fascia interrupta alba. *Fabr.*
 ptus. *sp. inf. I. p. 188. n. 148. mant. inf. I. p. 115. n. 195.*
Habitat in nova Hollandia, mediae magnitudinis.
- scutella- 372. C. ater, elytris crenato-striatis, pedibus anterioribus
 ris. elongatis. *Fabr. ment. inf. I. p. 115. n. 196.*
Habitat in terra van Diemen, magnus.
- longima- 373. C. fuscus, thoracis margine punctisque duobus ferrug-
 nus. neis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. sp. inf. I. p.*
 188. n. 149. *mant. inf. I. p. 115. n. 197.*
Habitat in Brasilia.
- raucus. 374. C. nigricans, elytris griseis cinereo punctatis. *Fabr. sp.*
inf. I. p. 188. n. 150. mant. inf. I. p. 115. n. 198. Herbst
apud Fuesli arch. inf. 5. p. 82. n. 64. t. 24. f. 25.
Habitat in Germania.
- spinifex. 375. C. cinereus fusco irroratus, thorace acute spinoso. *Fabr.*
mant. inf. I. p. 115. n. 199.
Habitat - - - gibbus, mediae magnitudinis

- chloro- 82. *C. niger*, antennis pedibusque rufis. *Fu. suec.* 635.* *Fabr.*
pus. *sp. inf.* I. p. 190. n. 163. *mant. inf.* I. p. 117. n. 218.
Bonsd. curc. Succ. 2. f. 19.
Habitat in Europae plantis, parvus, valde oblongus.
- tristis. 376. *C. niger*, elytris striatis cinereis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 190.
n. 164. *mant. inf.* I. p. 117. n. 219. *Bonsd. curc. Succ.*
2. f. 28.
Habitat in Anglia, Suecia.
- adsperfus. 377. *C. ater*, elytris posterioribus albo maculatis. *Fabr. sp. inf.*
I p. 190. n. 165. *mant. inf.* I. p. 117. n. 220.
Habitat in nova Hollandia.
- puncta- 378. *C. fuscus*, elytris punctis holosericeis elevatis margine-
tus. que flavo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 190. n. 166. *mant. inf.* I.
p. 117. n. 221.
Habitat in Europa boreali.
- obscurus. 379. *C. ovatus ferrugineo-fuscus*. *Fabr. sp. inf.* I. p. 191.
n. 167. *mant. inf.* I. p. 118. n. 222.
Habitat in Europa boreali.
- niger. 380. *C. ovatus scaber niger*, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* I.
p. 191. n. 168. *mant. inf.* I. p. 118. n. 223.
Habitat in Germania.
- variolo- 381. *C. niger*, thorace carinato varioloso, elytris striatis. *Fabr.*
fus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 169. *mant. inf.* I. p. 118. n. 224.
Habitat in Saxoniae campis.
- stri- 382. *C. thorace elytrisque variolosis nigris albo-punctatis.* *Fabr.*
cus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 170. *mant. inf.* I. p. 118. n. 225.
Habitat ad caput bonae spei.
- vulgus. 383. *C. ater nitens*, elytris punctato-striatis, femoribus annu-
lo cinereo. *Fabr. sp. inf.* I. p. 191. n. 171. *mant. inf.* I.
p. 118. n. 226.
Habitat in America meridionali.
- fuccin- 384. *C. ater*, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr.*
ctus. *sp. inf.* I. p. 191. n. 172. *mant. inf.* I. p. 118. n. 227.
Habitat ad caput bonae spei.
- rufipes. 83. *C. cinereus oblongus*, pedibus rufis. *Fu. suec.* 634.*
Habitat in Europa.

- nebulosus. 84. *C. canus*, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. succ.* 635.*
Fabr. sp. inf. I. p. 186. n. 142. *mant. inf.* p. 118. n. 184.
Bonsd. curc. Succ. 2. f. 4.
Geoffr. inf. par. I. p. 278. n. 1. t. 4. f. 8.
Fn. succ. I. n. 448. *Curculio albo nigroque varius*, proboscide planiuscula carinata thoracis longitudine.
Degeer inf. 5. p. 241. n. 27. *Curculio carinatus*.
Frösch inf. II. p. 32. t. 23. f. 5.
Schaeff. ic. t. 25. f. 3. *Knoch Beytr.* I. t. 6. f. 8.
 β) *Curculio nebulosus capensis*. *Sparrm. nov. act. Stöckh.* 1785. I. n. 4. p. 44. n. 18. t. 2.
Habitat in Europae campis frequens, β) duplo major ad caput bonae spei.
- fulcrosus. 85. *C. oblongus cinereus subnebulosus rostro trifurcato*. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 143. *mant. inf.* I. p. 114. n. 185.
Sparrm. nov. act. Stöckh. 1785. I. n. 4. p. 45. n. 19. t. 2.
Bonsdorf curc. Succ. 2. f. 5.
Habitat in Europae plantis, et ad caput bonae spei *statura et magnitudine nebulosi*.
- emarginatus. 385. *C. oblongus fuscus*, coleopterorum dorso cinereo: lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 186.
Habitat Halae Saxonum, *statura nebulosi*, *coleoptris apice emarginatis*.
- perlatus. 386. *C. niger*, abdomine albo: punctis elevatis glabris atris, rostro sulcato. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 187.
Habitat in Sina, *statura et magnitudine fulcrosus*.
- glaucus. 387. *C. rostro carinato thoraceque inaequali obscuris*, elytris glaucis: puncto posterius elevato. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 188.
Habitat Kilonii, *magnitudine et statura albini*.
- albidus. 388. *C. oblongus fuscus elytris albidis: fascia media lituraque baseos apicisque fuscis*. *Fabr. mant. inf.* I. p. 114. n. 189.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.
Curculio candidus.
Habitat in Germania, *nebuloso minor*.
- lusitanicus. 389. *C. oblongus supra fuscus*, elytris macula baseos alba. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 144. *mant. inf.* I. p. 115. n. 190.
Habitat in Lusitania, *statura et magnitudine incani*.

- crenulatus. 390. *C. cinereus*, elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 145. *mant. inf.* I. p. 115. n. 191. *Habitat in nova Hollandia.*
- punctatulus. 391. *C. niger*, elytris punctis nigris albisque alternis holosericeis striatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 187. n. 146. *mant. inf.* I. p. 115. n. 192. *Habitat in insula terrae novae, magnitudine c. ligustici.*
- ater. 86. *C. oblongus ater*, antennis rufis. *Fn. suec.* 637.* *Bonsd. curc. Suec.* 2. f. 20. *Habitat in Europa, an mera varietas chloropodis?*
- emeritus. 87. *C. niger*, thorace elytrisque spinosis fronte excavata. *Muf. Lud., Utr.* 56.* *Fabr. sp. inf.* I. p. 194. n. 190. *mant. inf.* I. p. 120. n. 249. *Habitat in America australi et India, aranei tristi facie. Elytra verrucis pilosis adspersa.*
- barbarus. 88. *C. thorace subspinoso*, elytris angulo duplici crispato. *Fabr. sp. inf.* p. 194. n. 191. *mant. inf.* I. p. 120. n. 250. *Habitat in Barbaria et Calabria, minor in Apulia, duplo minor in Gallia, punctis excavatis adspersus.*
- algius. 392. *C. cinereus*, thorace spinoso fulcato, elytris angulo duplici spinoso. *Fabr. mant. inf.* I. p. 120. n. 251. *Habitat in Africa et Calabria, barbaro triplo minor.*
- crispatus. 393. *C. thorace mutico scabro*, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 194. n. 192. *mant. inf.* I. p. 120. n. 252. *Habitat ad caput bonae spei.*
- globosus. 394. *C. thoraca spinoso quinquefulcato*, elytris laevibus. *Fabr. sp. inf.* I. p. 195. n. 193. *mant. inf.* I. p. 120. n. 253. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 50. n. 33. *Drury inf.* I. t. 32. f. 4. *Habitat ad caput bonae spei, an vere distinctus ab obeso?*
- obesus. 395. *C. ater*, thorace spinoso inaequali, elytris rubris: punctis nigris confertis. *Fabr. sp. inf.* I. p. 195. n. 194. *mant. inf.* I. p. 120. n. 254. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 50. n. 32. t. 2. *Habitat ad caput bonae spei.*

- scalaris. 396. *C. ater*, thorace spinoso inaequali, elytris striis rufis denticulatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 195. mant. inf. I. p. 120. n. 255.*
Habitat ad caput bonae spei.
- cultratus. 397. *C. cinereus*, thorace tuberculis duobus compressis, elytris tuberculatis posterius cinereis. *Fabr. sp. inf. I. p. 195. n. 196. mant. inf. I. p. 120. n. 256.*
Habitat in nova Hollandia.
- capensis. 89. *C. ater*, thorace elevato-punctato, elytris striato-crenatis. *Mus. Lud. Utr. 59. Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 184. mant. inf. I. p. 119. n. 242. Sparvm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 44. n. 16. t. 2.*
Habitat ad caput bonae spei.
- Vitulus. 398. *C. niger*, fronte bidentata, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 185. mant. inf. I. p. 119. n. 243.*
Habitat in Terra del Fuego.
- inaequalis. 399. *C. griseus*, thorace inaequali anterieus prominulo, elytris fulcatis, posterius bidentatis, rostro trifurcato. *Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 186. mant. inf. I. p. 119. n. 244.*
Habitat ad caput bonae spei, mediae magnitudinis.
- rostratus. 400. *C. fuscus*, capite thoraceque cylindricis angustioribus, elytris posterius spinosis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 187. mant. inf. I. p. 119. n. 245.*
Habitat in Africa aequinoctiali, mediae magnitudinis.
- Spectrum. 401. *C. thorace coleoptrisque globosis.* *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 188. mant. inf. I. p. 119. n. 246.*
Habitat ad caput bonae spei, parvus, singularis staturae.
- acuminatus. 402. *C. cylindricus fuscus*, elytris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 194. n. 189. mant. inf. I. p. 119. n. 247.*
Habitat in nova Seelandia.
- capistratus. 403. *C. fuscus*, elytris acuminatis crenato-striatis, rostro sulcato. *Fabr. mant. inf. I. p. 120. n. 248.*
Habitat ad caput bonae spei, magnus.
- verrucosus. 90. *C. aeneo-niger*, elevato-punctatus, elytris posterius verrucosis. *Mus. Lud. Utr. 60.* Fabr. sp. inf. I. p. 193. n. 183. mant. inf. I. p. 119. n. 241.*
Drury inf. I. 32. f. 5.
Habitat in Aethiopia.

- cornutus. 91. *C. cinereus*, thorace elytrisque subspinosis, capite spini fasciculato.- pilosis. *Mus. Lud. Utr.* 57. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 197. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 257.
Bonsd. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 46. n. 24. t. 2.
Habitat in nova Hollandia et ad caput bonae spei.
- Tribulus. 404. *C. cinereus*, thorace scabro anterieus impresso, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 198. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 258.
Habitat in nova Hollandia, rostro thoracem fere aequante apice incrassato.
- retusus. 405. *C. griseo-fuscus*, elytris posterioribus retusis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 195. n. 199. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 259.
Habitat ad caput bonae spei, statura cornuti.
- quadridens. 406. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinosis: spinis quatuor; posterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 200. *mant. inf.* 1. p. 120. n. 260.
Habitat in nova Hollandia,
- quadrispinosus. 407. *C. albidus*, elytris quadrispinosis, rostro fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 201. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 261.
Habitat ad caput bonae spei.
- Clavus. 408. *C. albicans*, thorace canaliculato, coleoptris spinosis lineolis tribus baseos rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 202. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 262.
Habitat in nova Hollandia.
- nodulosus. 409. *C. thorace lineis sex nodulosis*, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 203. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 263.
Sparbm. nov. act. Stockh. 1785. 1. n. 4. p. 42. n. 12? *Cuculio nodulosus.*
Habitat ad caput bonae spei.
- rubifer. 410. *C. cinereus*, thorace scabro, elytris spinis elevatis fangoneis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 204. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 264.
Habitat ad caput bonae spei.
- globifer. 411. *C. thorace scabro*, elytris spinosis posterioribus acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 196. n. 205. *mant. inf.* 1. p. 121. n. 264.
Habitat ad caput bonae spei.

- pilularius*. 412. C. thorace utrinque spinoso noduloso, elytris tuberculato-striatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inf. I. p. 121. n. 266.*
Habitat ad caput bonae spei, globifero proxime affinis.
- frontalis*. 413. C. ater, fronte retusa, thorace elytrisque tuberculato-seriatis. *Sparrrn. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 43. n. 14.*
Habitat ad caput bonae spei, praecedentibus affinis.
Thorax tuberculorum lineis 4, elytra conicorum utrinque tribus aspera.
- 16 puncta-92.* C. caerulescens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris sedecim. *Mus. Lud. Ulr. 58. Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 133. mant. inf. I. p. 111. n. 164.*
Habitat in Brasilia, crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.
- decorus*. 414. C. supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 134. mant. inf. I. p. 111. n. 165.*
Habitat in America meridionali.
- nitidulus*. 415. C. viridi-squamosus, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 135. mant. inf. I. p. 111. n. 166.*
Habitat in Cayenna, squamis cum aetate peresentibus niger.
- candidus*. 416. C. elytris spinosis albis: macula laterali fusca. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 136. mant. inf. I. p. 111. n. 167.*
Habitat in Cayenna.
- niveus*. 417. C. niveus, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. *Fabr. mant. inf. I. p. 111. n. 168.*
Habitat in Cayenna, statura candida.
- laetens*. 418. C. albus auro-nitidulus, elytris fulcatis acuminatis. *Fabr. sp. inf. I. p. 185. n. 137. mant. inf. I. p. 111. n. 169.*
Habitat in Jamaica, mediae magnitudinis, rostri apice bifido.
- smaragdulus*. 419. C. virefcens, elytris punctatis: spina anteriore posterioreque erecta valida. *Fabr. mant. inf. I. p. 111. n. 170.*
Habitat in Cayenna, statura candida, at paulo minor.
- 8 tuberculatus*. 420. C. cinereo fuscoque varius, coleoptris punctatis, posterioribus gibbis: tuberculis octo. *Fabr. mant. inf. I. p. 112. n. 171.*
Habitat in Cayenna, statura candida.

- Servus. 421. *C. capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis. Fabr. mant. inf. I. p. 112. n. 172. Habitat in Cayenna, statura et magnitudine octotuberculati.*
- modestus. 422. *C. cinereus, thorace elytrisque fusco-maculatis. Fabr. sp. inf. I. p. 186. n. 138. mant. inf. I. p. 112. n. 173. Habitat in nova Seelandia, mediae magnitudinis.*
- flavescens. 423. *C. obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. Fabr. mant. inf. I. p. 112. n. 174. Habitat in America meridionali, viridi affinis, at paulo major.*
- granulatus. 93. *C. viridis striatus punctis nigris elevatis. Mus. Lud. Ulr. 61.* Habitat in America australi et India, magnitudine scarabaei stercorarii.*
- abbreviatus. 94. *C. subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. Mus. Lud. Ulr. 62.* Gron. zooph. 597.* Habitat in Martinica.*
- apterus. 95. *C. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo-punctatis. Fabr. sp. inf. I. p. 196. n. 206. mant. inf. I. p. 121. n. 267. Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 95. Curculio brevisrostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. Degeer inf. 5. p. 275. z. 16. f. 1. Curculio cruciatus. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 31. t. 2. β) Curculio ornatus. Drury inf. 2. t. 34. f. 3. Habitat in India et ad caput bonae spei, maximus.*
- ocellatus. 424. *C. thorace spinoso anterieus excavato, elytris cinereis: punctis atris subocellatis. Fabr. sp. inf. I. p. 196. n. 207. mant. inf. I. p. 121. n. 268. Habitat in Madagascar.*
- nivofus. 425. *C. thorace elytrisque seriatim tuberculatis niveo lineatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 41. n. 11. Habitat ad caput bonae spei, subtus albido et flavesciente pruinosus vel minutim squamosus.*
- nyctemerus. 426. *C. albus, thorace elytrisque in parte summa atris, fasciis longitudinalibus albis nigrisque utrinque alternantibus,*

bus, abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 41. p. 42. n. 12.

Habitat ad caput bonae spei.

- Argus. 427. *C. tomentosus*, capite thoracisque margine anteriore griseo alboque punctatis, elytris striis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 43. n. 15.
Habitat ad caput bonae spei.
- Porculus. 428. *C. cinereo-fuscus pilosus*, thorace lineis quinque, elytris posterius maculis duabus albis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. n. 4. p. 45. n. 20.
Habitat ad caput bonae spei.
- Tottus. 429. *C. ex cinereo et fuscescente rufus*, rostro trifuriato, pedibus saepe rufescentibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 45. n. 21.
Habitat ad caput bonae spei.
- atratus. 430. *C. glabriusculus nigro-nitens*, elytris striatis: interstiorum punctis impressis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 46. n. 22.
Habitat ad caput bonae spei.
- cordiger. 431. *C. thorace subdidymo cordato*, utrinque aculeato, elytris striatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 46. n. 23.
Habitat ad caput bonae spei.
- Tauriculus. 432. *C. niger*, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato subcrispato scabro, elytris lineis quatuor tuberculosis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 25.
Habitat ad caput bonae spei.
- Juvenus. 433. *C. fronte excavato-retusa*, thorace scabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum serie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 26.
Habitat ad caput bonae spei, tauriculo affinis, at quadruplo minor.
- ephippatus. 434. *C. thorace tuberculis rugisque scabro*, elytris utrinque serie sesquitercia spinularum; sutura spinulis conniventibus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 47. n. 27.
Habitat ad caput bonae spei.

- cuculatus.** 435. *C. fronte depressa scabra, thorace anteriori porrecto rostroque bifurcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4 p. 48. n. 28.*
Habitat ad caput bonae spei, griseus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.
- Ura.** 436. *C. ater, capite emarginato, thorace anteriori foveolato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula bateos thoracis utrinque supra et subtus femorumque ferruginea. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 29.*
Habitat ad caput bonae spei.
- biglobatus.** 437. *C. niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utriusque ordinibus duobus. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 49. n. 30.*
Habitat ad caput bonae spei.
- calvus.** 438. *C. ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco laeviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso punctatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 34.*
Habitat ad caput bonae spei.
- senilis.** 439. *C. fuscus griseo-irroratus, thorace teretiussculo, elytris striis elevatis laevibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 35.*
Habitat ad caput bonae spei.
- Platina.** 440. *C. subtus lateribusque albo argenteo viridique aureo splendidus, supra pedibusque griseus, elytrorum falcis longitudinalibus atris. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 50. n. 36.*
Habitat ad caput bonae spei.
- Gallina.** 441. *C. griseus, subtus canus, thorace utrinque sulcis quinque subarcuatis obliquis, elytris leviter striatis. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 37.*
Habitat ad caput bonae spei.
- argynellus.** 442. *C. viridi-argenteus, oculis atris, rostro supra plano: linea longitudinali nigra impressa. Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. I. n. 4. p. 51. n. 39.*
Habitat ad caput bonae spei.

- nigellus. 443. *C. nigricans*, subtus ex griseo rufescens, antennis rectis, thorace elytrisque spinulosis. *Sparrm.-nov. act. Stockh.* 1785. I. n. 4. p. 52. n. 40.
Habitat ad caput bonae spei, statura albini, sed minor.
- Bonsdor- 444. *C. oblongus* albidissimus maculis quibusdam fasciaque
fii. nigris, rostro bifurcato fusco. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 21. n. 5. f. 6.*
Habitat in Sueciae, potissimum saliculis, statura fulcirostris, at duplo minor.
- tereticol- 445. *C. oblongo-oratus*, capite et thorace cylindricis angu-
lus. lis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 28. n. 14. f. 14. Degeer inf. 5. p. 246. n. 33.*
Habitat in Sueciae alnetis, non infrequens.
- liacellus. 446. *C. oblongus* cinereo fuscus, thorace striis tribus pallidioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 30. n. 17. f. 18.*
En. suec. 1. n. 472. Curculio cinereus, fasciis longitudinalibus dilutionibus.
Habitat in Suecia, pediculi magnitudine, lineato affinis.
- echinatus. 447. *C. ferrugineus*, abdomine globoso, elytris setis erectis dense echinatis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 33. n. 21. f. 22.*
Mill. zool. dan. prodr. p. 86. n. 947. Curculio scaber?
Habitat in Suecia, subtus fuscus, ano rufa.
- Truncu- 448. *C. ater*, abdomine subgloboso, rostro brevissimo, antennis pedibusque rufis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 33. n. 22. f. 23.*
Habitat in Suecia,
- capitatus. 449. *C. fusco cinereus*, sutura elytrorum basi nigra, rostro brevissimo lato, abdomine subgloboso. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 33. n. 23. f. 24. Degeer inf. 5. p. 245. n. 32.*
Habitat in Sueciae pinetis, vulgatiore, c. coryli proxime affinis.
- asperatus. 450. *C. cinereus*, abdomine ovato, elytris setis erectis brevissimis exasperatis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 34. n. 24. f. 25. Geoffr. inf. par. 1. p. 288. n. 23.*
Habitat Upsaliae in arbutis, primo vere sub seccis foliis conspicuus.

- succicus.** 451. *C. ovatus*, posterius obtusissimus obscurus, thorace carinulato, antennis et pedibus fuscis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 29. f. 30.*
Habitat in Suecia.
- murinus.** 452. *C. ovatus* griseo-fuscus, elytris pallide maculatis, posterius setosis, rostro sulcato. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 37. n. 30. f. 31. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 943. fn. Fridrichsd. n. 116.*
Habitat in Scandinaviae plantis.
- elavipes.** 453. *C. oblongo ovatus* gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis crassis. *Bonsd. curc. Suec. 2. p. 40. n. 35. f. 36.*
Habitat in Hallandia Sueciae.
- inderien-** 454. *C. apterus ovatus* opalino-albus, thorace utrinque mucronato, elytris excavato punctatis. *Pall. inf. ross. 1. p. 26. z. B. f. 5. it. 1. app. p. 464. n. 36.*
Lepech. it. 1. p. 508. z. 16. f. 5.
Habitat circa lacum salsum Inderiensem frequens, faebae minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.
- nomas.** 455. *C. albus*, rostro crasso biporcato, thorace scaberrimo, elytris fusco oblique lituratis. *Pet. gaz. t. 23. f. 4? Pall. it. 1. app. p. 463. n. 31. inf. ross. 1. p. 27. z. B. f. 6.*
Habitat in aridissimis deserti caspici, frequens circa fontes lacusque salfos, habitu nebulosi, sed major, 10 lineas longus.
- candida-** 456. *C. albo-nebulosus*, rostro crasso: stria bifurca, thoracis dorso cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it. 1. app. p. 463. n. 32. inf. ross. 1. p. 28. z. B. f. 7.*
Habitat in aridis deserti caspici, frequentissimus circa lacum Inderiensem, sulcirostri paulo major, subtus candidissimus.
- roridus.** 457. *C. apterus* rufescente albus, supra lituris punctisque subverrucosis nigris, porco rostri crassi longitudinali. *Pall. inf. ross. 1. p. 28. z. B. f. 8.*
Habitat in salis torridis deserti australis ad Volgam, circa sulfolarum et atriplicum radices, sulcirostris magnitudine, at crassior.
- Cenchrus.** 458. *C. dealbatus*, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, rostro crasso uniporcato. *Pall. inf. ross. 1. p. 29. z. B. f. 9.*

Habitat

Habitat in torridis et squalidis deserti Volgenfis rarior, sulcirostri minor, magis teres.

- tetra- 459. *C. apterus cinerascens*, thorace fusco: lineis quatuor la-
grammus. steis, elytrorum litoribus quatuor nigris, rostro crasso.
Pall. inf. ross. I. p. 29. t. B. f. 10.
Lepech. it. 2. app. p. 329. t. II. f. 28.
Habitat in squalidis aridissimis deserti Volgenfis maxime au-
stralis rarior, major, elegans.
- tribuloi- 460. *C. thorace bicristato scabro*, elytris spinis conicis axilla-
des. ribus posterioribusque rostro crasso. *Pall. inf. ross. I.*
p. 30. t. B. f. 11.
Habitat in Rio Janeiro Americae, habitu iberiensis, euro-
paeis omnibus major.
- nigrivit- 461. *C. cylindricus dealbatus*, capite thoraceque subcarinatis:
tis. fascia utrinque longitudinali fusca. *Pall. inf. russ. I.*
p. 31. t. B. f. 12.
Habitat in aridis squalentibus deserti caspici, frequens, octo
lineas longus.
- Vibex. 462. *C. cylindricus albissimus*, thorace elytrisque striga utrin-
que nigra longitudinali. *Pall. inf. ross. I. p. 32. t. B. f. 13.*
Habitat in arenosis ad Selengam, frequens.
- fenestra- 463. *C. apterus albus*, rostro crasso, elytrorum maculis sex
tus. rhombeis fuscis. *Pall. inf. ross. I. p. 33. t. H. f. B. 16.*
Habitat in sabulosis ad Selengam, nebulofo minor.
- flaviceps. 464. *C. apterus albatus*, capite flavescente lateribus rufis, ro-
stro crasso, thorace elytrisque albo lineatis fusco inter-
ruptis. *Pall. inf. ross. I. p. 34. t. B. f. 17.*
Lepech. it. 2. app. p. 327. t. II. f. 27.
Habitat in arenosis ad Selengam et Chonem, rarior in Ta-
tariae desertis, magnitudine feminis atri.
- pictus. 465. *C. albus*, rostro crasso, thorace fasciis tribus longitudinali-
bus, elytrorum arcuata fuscis. *Pall. it. I. app. p. 463.*
n. 33. inf. ross. I. p. 35. t. H. f. B. 18.
Habitat rarior in aridissimis salis deserti caspici, circa la-
cum quoque Inderientem.
- hololeu- 466. *C. subcylindricus totus albus immaculatus*, rostro crasso,
cos. oculis atris. *Pall. inf. ross. I. p. 35. t. H. f. B. 19.*
Habitat in squalidis deserti caspici, sub atriplicibus et salis.
467. *C.*

- tenebrioides. 467. *C. apterus aterrimus glaber, elytris laevigatis.* *Pall. ross. I. p. 36. t. B. f. 20.*
Frisch inf. 13. p. 28. t. 26?
Schaeff. ic. t. 62. f. 11.
Habitat rarior in deserti caspici aridis, hami inter tenebrioides apteros.
- albator. 468. *C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, striis compressis pubescentibus: fasciis lateralibus niveis.* *Pall. inf. ross. I. p. 36. t. B. f. 21.*
Habitat in Brasilia, major.
- noveboracensis. 469. *C. canus, elytris subsaffigiatis: striis quinque albidis, medio punctatis, scutello flavicante.* *Forst. nov. inf. sp. p. 35. n. 35.*
Habitat in Noveboraco, 7 lineas longus.
- melanogrammus. 470. *C. corpore cano, sutura elytrorum anterior nigra, tida, rostro brevissimo.* *Forst. nov. inf. sp. I. p. 36. n.*
Habitat in Anglia, incano dimidio minor.
- plagiatus. 471. *C. subglobosus, elytris punctis longitudinalibus impressisque e cinereo et fusco alternis.* *Schaller Abb. hall. Naturf. Ges. I. p. 284.*
Habitat in Marchia, statura C. coryli, at multoties major.
- cinereus. 472. *C. oblongus cinereus, elytris albido nebulosis: prioribus fascia albida.* *Schall. Abb. der hall. Naturf. Ges. p. 285.*
Habitat, rarus, Halae Saxonum, lineati statura.
- sericeus. 473. *C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus subdentatis.* *Schall. Abb. hall. Naturf. Ges. I. p. 286.*
Habitat Halae Saxonum in sulice, aestate frequentissimus, argentato affinis, lineati statura et magnitudine.
- tenebriocofus. 474. *C. niger nitidus, oculis fuscis, elytris connatis acuminatis excavato-punctatis.* *Herbst apud Fueßli an inf. 5. p. 81. n. 67. t. 24. f. 27.*
Habitat Berolini, rarissimus, 5 lineas longus, tenebriocofus affinis.

- Faber. 475. *C. niger*, rostro lato, antennis fuscis, elytris connatis: punctorum excavatorum seriebus octo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 81. n. 68. t. 24. f. 28.*
Habitat in Marchia.
- major. 476. *C. niger albido villosus*, thorace punctato rugoso rostrum aequante, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 81. n. 69. t. 24. f. 29.*
Habitat Berolini, germanorum maximus.
- linzensis. 477. *C. apterus fuscus*, thoracis elytrorumque lateribus rufis. *Schrank enum. inf. austr. p. 123. n. 234.*
Habitat Linzii.
- splendendus. 479. *C. viridis angustissimus*, oculis fuscis, antennis pedibusque fuscescentibus, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 72. t. 24. f. 30.*
Habitat Berolini, 3 lineas longus.
- trivialis. 480. *C. cinereus*, thorace lineis tribus exoletis albis, elytris maculis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 73.*
Habitat Berolini, 3 fere lineas longus, statura c. polygoni.
- arenarius. 481. *C. capite cano*, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griseis punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 22. n. 74.*
Habitat Berolini, statura c. ligustici, at dimidio minor.
- berolinensis. 482. *C. albicans*, subtus varius, thorace rugoso nigro ad latera variegato, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.*
Habitat Berolini, frequens nebuloso affinis, at multo minor.
- globatus. 483. *C. capite thoraceque fuscescentibus subaeneis*, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine subglobofo, elytris connatis punctato-striatis: interstitiis fasciis alternis cinereis et fuscescentibus maculisque obsolete albidis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 76. t. 24. f. 32.*
Habitat Berolini frequens, variae magnitudinis.
- Viverra. 484. *C. fordide cinereus*, rostro lato, thorace scabro; anteriorius turgido, per mediam longitudinem sulcato, elytris striatis:

striatis: interstitiis scabris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 77.*

Habitat in Pomerania, vix sesquilineam longus, antennis fuscis.

Herbstii. 485. *C. cinereus*, thorace subgloboso granulato, elytris rotundatis striatis: ocellis rubro-aureis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 78.*

Habitat Berolini, rarior.

pyricola. 486. *C. angustus ater*, subtus antennisque spadiceus, thorace granulato, elytris fulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 79.*

Habitat in Pomerania, vix 2 lineas longus, rostro paulo longiore.

granulatus. 487. *C. ovatus griseus*, supra granulatus: granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 80. t. 24. f. 33.*

Habitat in Marchia, 3 lineas longus.

piniperda. 488. *C. spadiceus*, thorace elongato punctato, elytris punctato-striatis, femoribus subdentatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 81.*

Habitat in Marchia, 1½ lineam longus, facie bostrichi piniperdae.

futuralis. 489. *C. elongatus cinereus fusco subvarius*, subtus, lateribus futuraque albus, antennis oculisque nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 84. n. 82. t. 24. f. 34.*

Habitat in Marchia, angustus, 3 lineas longus.

Eremita. 490. *C. supra flavescente-pilosus*, rostro tenui thoraceque subpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-striatis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 85. n. 83.*

Habitat in Marchia, 2 lineas longus.

bruchoides. 491. *C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis et striatis.* *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 85. n. 84.*

Habitat in Marchia, brucho similis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, crassus rostro pendulo.

singularis. 492. *C. subbrevisrostris cinereus*, elytris striis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1066. n. 3.*

Habita

- Habitat in Lusitania, mediae magnitudinis, femoribus clavatis.*
- carinatus. 493. C. subbrevisrostris niger, thorace subcarinato, elytris angularis tuberculatis. *Syst. nat. XII. 2. add. p. 1066. t. 3.*
Habitat in Lusitania, barbaro similis, at quadruplo minor.
- oedematus. 494. C. niger glaber politus, elytris rubris. *Sulz. hist. inf. p. 40. t. 4. f. 10.*
Habitat in Europa.
- Cypri. 495. C. sulcatus, linea dorsu longitudinali atra. *Hasslq. it. p. 449. n. 100.*
Habitat in Cypro.
- albidus. 496. C. apterus supra albicans, subtus dilute roseus, thorace bicuspidato, elytris sulcatis: punctis canis. *Lepech. it. I. p. 313. t. 17. f. 7.*
Habitat in Russia.
- bipunctatus. 497. C. thorace scabro, elytris nebulosis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it. 2. p. 205. t. 11. f. 25.*
Habitat in Sibiria.
- guttatus. 498. C. niger, vellere rufescente nigro punctato: punctis in elytris transparentibus. *Lepech. it. 2. p. 205. t. 11. f. 30.*
Habitat in Sibiria.
- populneus. 499. C. ater, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn. n. 74.*
Habitat in Carniolia, c. fagi proximo affinis, at femoribus aequalibus.
- piger. 500. C. femoribus anterioribus clavatis, rostro striis elevatis fenis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn. n. 65.*
Habitat in Carniolia.
- iners. 501. C. rostro linea elevato unica, elytris striis decem punctatis. *Scop. ent. carn. n. 68.*
Habitat in Carniolia.
- resinosus. 502. C. niger scaber, abdomine subtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn. n. 67.*
Habitat in Carniolia.
- picatus. 503. C. piceus, abdomine nigro, subtus albedo, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn. n. 69.*
Habitat in Carniolia.

- erraticus. 504. C. rostro apice concavo, elytris subvillosis striatis: stria tertia tuberculata. *Scop. ent. carn. n. 70.*
Habitat in Carnioliâ.
- Gr. al- 505. C. ex eupreo nigroque varius, elytris ad angulum basales
 bum. externum linea arcuata alba. *Scop. ent. carn. n. 99.*
Habitat in Carnioliâ.
- fenfitivus. 506. C. niger, femoribus fulvis apice nigris. *Scop. ent. carn.*
n. 100.
Habitat in Carnioliâ.
- nemoreus. 507. C. apterus niger opacus, capite glabro, rostro bifido,
 thorace elytrisque scabris acuminatis. *Scop. ent. carn.*
n. 101.
Habitat in Carnioliâ.
- Momus. 508. C. rostro supra bifurcato, abdomine posteriori fulvo vil-
 loso, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn.*
n. 102.
Habitat in Carnioliâ.
- Zoilus. 509. C. rostro deflexo, elytris striatis nigro punctatis. *Scop.*
ent. carn. n. 103.
Habitat in Carnioliâ.
- querciu- 510. C. niger, scutello triloba: lobo anteriore albo, elytris
 nus. puncto albo. *Scop. ent. carn. n. 106.*
Habitat in Carnioliâ et Helvetiâ quercu.
- carnioli- 511. C. niger, thorace albido, elytris stria quinque elevatis ni-
 cus. gris albo-punctatis. *Scop. ent. carn. n. 107.*
Habitat in Carnioliâ.
- villosulus. 512. C. rufus subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus
 obsoletis. *Scop. ent. carn. n. 108.*
Habitat in Carnioliâ.
- præcox. 513. C. ferrugineus, elytris striatis subvillosis. *Scop. ent. carn.*
n. 109.
Habitat in Carnioliâ, sub finem Aprilis conspicuus.
- tricolor. 514. C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis:
 margine interiore albo, lineisque binis longitudinalibus
 flavis. *Scop. ann. hist. nat. 5. p. 91. n. 45.*
Habitat

- dentiro- 515. *C. ovatus niger*, rostro apice quadridentato. Müll. zool.
stis. dan. prodr. p. 85. n. 941.
Habitat in Dania.
- tardus. 516. *C. nigricans*, thorace elytrisque utrinque rufis: macu-
la apicis atra. Müll. zool. dan. prodr. p. 86. n. 942.
Habitat in Dania.
- nodosus. 517. *C. canescens*, elytris nodulis minimis friatis. Müll.
zool. dan. prodr. p. 86. n. 948.
Oloff. it. isl. I. p. 319. Silakkepr.
Habitat in Islandia.
- longicor- 518. *C. nigricans*, thorace hirta, elytris cinereis: maculis
nis. flavicantibus, pedibus antennisque rufis. Müll. zool.
dan. prodr. p. 86. n. 949.
Habitat in Dania.
- opacus. 519. *C. totus griseus laevissimus*. Müll. zool. dan. prodr. p.
46. n. 950.
Habitat in Dania.
- bicolor. 520. *C. griseus*, antennis pedibusque rufescentibus. Müll. zool.
dan. prodr. p. 46. n. 951.
Habitat in Dania.
- maculo- 521. *C. ovatus*, obscure flavicans, elytris luteo maculatis. Müll.
sus. zool. dan. prodr. p. 46. n. 952.
Habitat in Dania.
- fuluratus. 522. *C. cervinus ovatus* elytris lineis tribus elevatis: futura
posterius carinata. Müll. zool. dan. prodr. p. 46. n. 955.
Habitat in Dania.
- terlinea- 523. *C. elongatus cinereus*, thorace terlineato, antennis ni-
tus. gris. Müll. zool. dan. prodr. p. 46. n. 956.
Habitat in Dania.
- mollis. 524. *C. griseo-auratus*, elytris mollibus. Müll. zool. dan. prodr.
p. 87. n. 960.
Aët. Nidr. 4. p. 12. t. 16. f. 6.
Habitat in Scandinavia.
- undula- 525. *C. griseus nitens*, fasciis elytrorum undulatis ferrugineis.
tus. Müll. zool. dan. prodr. p. 87. n. 961.
Aët. Nidr. 4. p. 13.
Habitat in Scandinavia.

Aaaaaa



26. C.

- bispinus. 526. *C. caeruleus*, thorace utrinque spinoso, antennis nigris.
Müll. *zool. dan. prodr.* p. 91. n. 1023.
Schaeff. *ic. t. 6. f. 4.*
Habitat in Europa.
- inermis. 527. *C. violaceus*, thorace puncto utrinque impresso, antennis nigris. Müll. *zool. dan. prodr.* p. 91. n. 1025.
Schaeff. *ic. t. 56. f. 8.*
Habitat in Europa.
- fuscatus. 528. *C. nigro-fuscus*, thorace utrinque fascia longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. Geoffr. *ins. par. I. p. 280. n. 7.*
Habitat in Gallia.
- fimbriatus. 529. *C. niger*, thorace punctato, elytris alternatim striatis et punctatis. Geoffr. *ins. par. I. p. 281. n. 9.*
Habitat in Gallia.
- exaratus. 530. *C. oblongus totus niger*, thorace punctato, elytris sulcatis. Geoffr. *ins. par. I. p. 282. n. 11.*
Habitat in Gallia.
- squamosus. 531. *C. squamis nitentibus*, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. Geoffr. *ins. par. I. p. 284. n. 14.*
Habitat in Gallia.
- Geoffroaei. 532. *C. rufus subvillosus*, capite nigricante. Geoffr. *ins. par. I. p. 284. n. 15.*
Habitat in Gallia.
- gramineus. 533. *C. caeruleo-viridis nitens*, thorace punctato, elytris striatis. Geoffr. *ins. par. I. p. 284. n. 16.*
Pet. gazoph. p. 77. n. 6.
Habitat in Europa.
- dolorosus. 534. *C. oblongus niger*, abdomine squamoso: lateribus albis. Geoffr. *ins. par. I. p. 285. n. 17.*
Habitat in Gallia.
- denticulatus. 535. *C. ovatus ex nigro cinereus*, thorace utrinque denticulato. Geoffr. *ins. par. I. p. 288. n. 24.*
Habitat in Gallia.
- aculeatus. 536. *C. subrotundus niger squamosus*, elytris striatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis. Geoffr. *ins. par. I. p. 288. n. 25.*
Habitat in Gallia.

- subglobo- 537. *C. subglobosus* ex cinereo ater, striatus, rostro thoracis lon-
 ius. gitudine. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 26.*
Habitat in Gallia.
- erythro- 538. *C. globosus rufus*, elytris striatis: fascia rransversa alba.
 leucos. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 27.*
Habitat in Gallia.
- leucozo- 539. *C. globosus niger*, elytris striatis: fascia transversa alba.
 nius. *Geoffr. inf. par. I. p. 289. n. 28.*
Habitat in Gallia.
- spinosus. 540. *C. totus fuscus spinosus*, elytris striis elevatis villoso-
 spinosis. *Geoffr. inf. par. I. p. 412. n. 97.*
Habitat in Gallia.
- armus. 541. *C. niger*, scutello albicante, elytrorum striis utrinque
 denticulatis. *Geoffr. inf. par. I. p. 290. n. 31.*
Habitat in Gallia.
- marmora- 542. *C. lividus*, coleoptris fasciis plurimis obscuris. *Geoffr.*
 tus. *inf. par. I. p. 291. n. 33.*
Habitat in Gallia.
- bohemi- 543. *C. corpore*, capite antennisque nigris, thorace papilloso
 cus. et elytris quatuor papillarum ordinibus insignitis cinereis
 incanis. *Richter Abb. Naturg. Boehm. p. 34.*
Habitat in districtu Bohemiae Reichenbergensi, subglobosus,
magnitudine dermestis pellionis.
- rotunda- 544. *C. apterus*, corpore oblongo nitido nigro laevi. *Degeer*
 tus. *inf. 5. p. 243. n. 29. t. 7. f. 22.*
Habitat in Europa, 3½ lineas longus.
- multico- 545. *C. corpore subgloboso ex rufo fusco: punctis ex flavo gri-*
 lor. *seis, elytris carinatis. Degeer inf. 5. p. 244. n. 30.*
Habitat in alno, mediae magnitudinis.
- ochropus. 546. *C. corpore oblongo viridi nitido, antennis pedibusque fla-*
 vis. *Degeer inf. 5. p. 245. n. 31.*
Habitat in Europa, ultra 2 lineas longus.
- fascicula- 547. *C. corpore ovato fusco: fasciculis pilosis griseis, antennis*
 tus. *longis. Degeer inf. 5. p. 276. n. 10. t. 16. f. 2.*
Habitat Surinami.

- fulviro- 549. *C. nigro-aeneus* rostro plano pedibusque flavescens.
 stris. *Fabr. mant. inf. 2. app. p. 381.*
Habitat in Scania parvus.
- triangula- 551. *C. obscurus flavicans*, thoracis basi triangulari, elytris
 ris. striato-punctatis. *Petagn. inf. Calabr. p. 14 n. 71.*
Habitat Brancaloni in Calabria, in carduorum floribus frequens.
- formosus. 553. *C. corpore virescente*, antennis pedibusque rufis. *Mayer*
Abb. boeim. Gef. 4. p. 183.
Habitat in Bohemiae floribus cardui, magnitudine c. pyri.
- carinatus. 582. *C. griseus oblongus*, rostro carinato: carina utrinque fu-
 scata, thorace elytrisque punctatis: his polline griseo con-
 sperfis: punctorum ordinibus decem, pedibus ant. longioribus: femoribus tibisque fusco annulatis. *Mus. Lesk.*
p. 21. n. 445.
Habitat extra Europam.
- crassiro- 583. *C. griseus*, rostro crasso supra rugoso, thorace nigro pun-
 stris. ctato, elytris obsolete rugosis: pilis erectis hispidis, abdo-
 mine fusco. *Mus. Lesk. p. 21. n. 449.*
Habitat in Europa.
- dealbatus. 584. *C. oblongus variolosus niger*, polline albo conspersus,
 elytris fasciis obliquis duabus maculisque tribus albis, ab-
 domine nigro punctato. *Mus. Lesk. p. 21. n. 450.*
Habitat in Europa.
- incinera- 585. *C. niger*, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis qua-
 tus, tuor punctisque sparsis cinereis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 456.*
Habitat in Europa.
- planiro- 586. *C. subglobosus griseus*, rostro explanato, elytris striatis
 stris. erecto-pilosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 459.*
Habitat in Europa.
- varius. 587. *C. elytris griseo fulvoque variis punctato-striatis: pun-*
 ctis holosericeis fuscis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 461.*
Habitat in Europa.
- naevius. 588. *C. naevius*, rostro crasso supra plano fusco, elytris rugo-
 sis: sutura elevata posterius carinata, femoribus fuscis,
 tibis rufis griseo-squamosis. *Mus. Lesk. p. 21. n. 463.*
Habitat in Europa.

- coracinus. 589. *C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoracæque punctatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 465.*
Habitat in Europa.
- latirostris. 590. *C. elytris punctato-striatis cinereo-pilosis, rostro brevi lato stria dorsali exarato. Mus. Lesk. p. 22. n. 466.*
Habitat in Europa.
- hirtus. 591. *C. fuscus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hispidis punctato-striatis griseis: horum marginibus externis albidis. Mus. Lesk. p. 22. n. 467.*
Habitat in Europa.
- rugatus. 592. *C. griseus, thoracis dorso elytrorumque rugosorum futura ferrugineo-fusca, thoracis dorso utrinque puncto. Mus. Lesk. p. 22. n. 470.*
Habitat in Europa.
- infuscatus. 593. *C. rostro thoracæque fuscis: hujus lineis tribus griseis, elytris tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 471.*
Habitat in Europa.
- obsoletus. 594. *C. fusco-griseus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 472.*
Habitat in Europa.
- subrufus. 595. *C. fulvo-griseus, antennis tibiisque rufescentibus. Mus. Lesk. p. 22. n. 473.*
Habitat in Europa.
- clavipes. 596. *C. oblongus fuscus cinereo adpersus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. Mus. Lesk. p. 22. n. 475.*
Habitat in Europa.
- exoletus. 597. *C. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 478.*
Habitat in Europa.
- nubilus. 598. *C. fuscus griseo-nebulosus, rostro lato plano, elytris striatis apice obtusis. Mus. Lesk. p. 22. n. 479.*
Habitat in Europa, magnitudine pediculi, statura c. Albini.
- tenebricolus. 599. *C. niger subaeneus ovatus hirtus punctato-striatus, antennis pedibusque rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 481.*
Habitat in Europa.
- lutosus. 600. *C. lutosus ovatus, antennis rufis. Mus. Lesk. p. 22. n. 482.*
Habitat in Europa.

RHINOMACER. *Antennae setaceae, rostro infidentes.*
Palpi quatuor extrorsum crassiores.

curculioi- 1. Rh. villoso-griseus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. des. inf. 1. p. 123. n. 1.*

Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 1. Rhinomacer curculioides.

Habitat in Italia, statura curculionis, subtus cinereus, pedibus nigris.

attelaboi- 2. Rh. villoso-piceus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf. 1. p. 123. n. 2.*

Habitat in Sueciae pinetis, curculioide minor.

caeruleus. 3. Rh. caerulefcens subvillosus antennarum basi pedibusque flavis. *Petagn. inf. Calabr. p. 14. n. 72. f. XXXIV.*

Habitat ad littora Calabriae, Brancaloni; an forte Attelabi species?

ATTELABUS. *Caput posterius acuminatum, inclinatum.*

Antennae moniliformes, apicem versus crassiores.

* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A. niger, clytris rufis reticulatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 199. n. 1. mant. inf. 1. p. 124. n. 1.*

Syst. nat. XII. 2. p. 619. n. 1. Fu. suec. 638. Amoen. acad. 5. t. 3. f. 171. Attelabus niger, clytris rubris.

Tr. oel. 153. Curculio niger, clytris rubris, capite postice elongato.

Degeer inf. 5. p. 257. n. 46. t. 8. f. 3. Curculio excoxiatoruber.

Geoffr. inf. par. 1. p. 273. n. II.

Pontopp. atl. Dan. p. 205. n. 1. t. 16.

Sulz. hist. inf. t. 4. f. 1.

Schaeff. ic. t. 75. f. 8.

Habitat in coryli foliis, quae in cylindrum convolvit, et utrinque claudit.

- avellanæ. 2. *A. niger*, elytris, thorace pedibusque rubris.
Scop. ent. carn. 71. *Curculio collaris*.
Schæff. ic. t. 56. f. 5. 6.
Habitat in Germaniæ corylis, a. coryli similis; an mera va-
rietas?
- bicolor. 32. *A. niger*, thorace elytrisque rufescentibus, scutello femo-
 rum tibiærumque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23.
n. 504.
Habitat in Europa.
- denigra- 33. *A. niger*, thorace elytrisque rubris, dorsi macula tibiis
 tus. femorumque basi et apice nigris. *Mus. Lesk. p.* 23. *n.* 505.
Habitat in Europa.
- erythro- 34. *A. niger*, elytris rubris laevissimo striato-punctatis. *Mus.*
 pterus. *Lesk. p.* 23. *n.* 506.
Habitat in Europa.
- bipustula- 11. *A. ater*, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf.* 1.
 tus. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 2.
Habitat in America septentrionali.
- gemma- 14. *A. ferrugineus*, tuberculis nigris sparsis. *Thunb. nov.*
 tus. *inf. spec.* 3. *p.* 68. f. 80. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 4.
Habitat ad caput bonæ spei, magnitudine et figura a. coryli.
- indicus. 15. *A. ferrugineus*; capite, elytrorum basi fasciaque cyaneis.
Thunb. nov. inf. sp. 3. *p.* 68. f. 81. *Fabr. mant. inf.* 1.
p. 124. *n.* 5.
Habitat in India, statura et magnitudine melanuri.
- curculio- 3. *A. niger*, thorace elytrisque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200.
 noides. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 72. *Curculio nitens*.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 273. *n.* 10.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 12.
Schæff. ic. t. 75. f. 8.
Habitat in Europæ corylo, salice, a. coryli similis, sed minor.
- surina- 4. *A. elytris apice bidentatis.*
 menfis. *Habitat Surinami, pennsylvanico similis, a. coryli minor,*
niger; elytris fuscis, pedibus ferrugineis, antennis albo
nigroque annulatis. Rolander.

- penfylvanicus. 5. *A. niger*, elytris rubris: fascia media apicisque nigra. *Fabr. mant. inf. 1. p. 124. n. 3.*
Habitat in America boreali, statura surinamensis, sed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtusis basi flavescens, thorace oblongo glabro.
- melanturos. 6. *A. niger*, elytris testaceis apice nigris.
Habitat Upsaliae, pensylvanico similis, sed major, antennarum abdominisque basi et elytris testaceis.
- angulatus. 16. *A. ferrugineus*, coleoptis angulatis: disco nigro. *Fabr. mant. inf. 1. p. 124. n. 7.*
Habitat in Cayenna, statura A. coryli, antennis et pectore nigris.
- ruficollis. 17. *A. rufus*, capitis vertice nigro, elytris caeruleis nitidis.
Fabr. sp. inf. 1. p. 200. n. 4. mant. inf. 1. p. 124. n. 8.
Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 87. n. 3. t. 25. f. 1. a.
Habitat in Sibiria, statura a. coryli, antennarum apice caeruleo.
- pubescens. 18. *A. violaceus hirtus*, rostro atro. *Fabr. sp. inf. 1. p. 200. n. 5. mant. inf. 1. p. 124. n. 9.*
Habitat in Germania, rostro longiori.
- betulae. 7. *A. ater*, pedibus saltatoriis. *En. succ. 640.* Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 6. mant. inf. 1. p. 124. n. 10.*
Degeer inf. 5. p. 259. n. 47. Curculio excoriato-niger, Habitat in betulae foliis, quae rodendo pulcre cispa reddit, acerrime saliens.
- ** *maxilla unidentata.*
 † *palpis posterioribus securiformibus, Cleri.*
- mutillarius. 19. *A. niger*, elytris fascia triplici alba basi rufis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 1. mant. inf. 1. p. 125. n. 1. Herbst apud Fueßli arch. inf. 5. p. 87. n. 1. t. 25. f. 2.*
Schrank inf. austr. n. 34. Dermestes fornicarioides, Habitat Halae Saxonum.
- dubius. 20. *A. rufus*, elytris nigris: fascia duplici alba basi que rufis.
Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 2. mant. inf. 1. p. 125. n. 2.
Habitat in America boreali.

- schneu- 21. *A. capite thoraceque rufis, elytris nigris: fascia media
montius. rufa strigaeque apicis alba. Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 3.
mant. inf. 1. p. 125. n. 3.
Habitat in America boreali.*
- formica- 8. *A. niger, thorace rufo, elytris fascia duplici alba basique
rius. rubris. Fn. suec. 641. Scop. ent. carn. III. Fabr. sp.
inf. 1. p. 201. n. 4. mant. inf. 1. p. 125. n. 5.
Degeer inf. 5. p. 160. n. 3. z. 5. f. 8. Clerus formicarius.
Schranck inf. austr. p. 21. n. 31. Dermestes formicarius.
Raj. inf. p. 103. n. 29.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 8.
Habitat in Europa et boreali America, ptinum pertinacem
devastans, larva inter corticos putridos.*
- sphageus. 22. *A. niger, fronte elytrorumque fascia cinereis. Fabr. mant.
inf. 1. p. 125. n. 4.
Habitat in America boreali, statura et magnitudine formi-
carii.*
- sexgutta- 23. *A. niger, fronte cinerascens, elytris maculis tribus albis.
tus. Fabr. sp. inf. 1. p. 201. n. 5. mant. inf. 1. p. 125. n. 6.
Habitat in America meridionali.*
- quadri- 24. *A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis.
maculatus. Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 288. Fabr. mant.
inf. 1. p. 125. n. 7.
Habitat in Halae Saxonum pinetis, parvus.*
- unifascia- 25. *A. niger, elytris fascia alba basi rubris. Fabr. mant. inf.
tus. 1. p. 125. n. 8.
Sulz. hist. inf. t. 4. f. 13. Attelabus formicarius minor.
Habitat in Helvetiae et Africae onopardo.*
- octopun- 26. *A. cyaneus hirtus, elytris rufis: punctis quatuor nigris.
ctatus. Fabr. mant. inf. 1. p. 126. n. 9.
Habitat in Hispaniae umbellatis, statura formicarii.*
- tricolor. 27. *A. rufus, capite nigro, elytris basi caeruleis, medio rufis
apice violaceis. Fabr. sp. inf. 1. p. 202. n. 6. mant. inf. 1.
p. 126. n. 10.
Habitat in Africa aequinoctiali, formicarii minor.*
- bifascia- 28. *A. viridi-aeneus pubescens, elytris cyaneis: fasciis dua-
tus. bus coccineis. Fabr. sp. inf. 1. p. 202. n. 7. mant. inf. 1.
p. 126. n. 11.
Habitat in Sibiria, formicarii magnitudine.*

sipyfus. 9. A. viridis, elytris fascia duplici flava interrupta, thorace hirsuto. *Mus. Lud. Utr.* 63.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 202. n. 8. *mant. inf.* 1. p. 126. n. 12.

Habitat in Africa, statura et magnitudine fornicarii.

Ammios. 29. A. viridis hirtus, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; posterioribus lunatis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 13.

Habitat in Africae ammi majori, statura et magnitudine apiarii.

apiarius. 10. A. caerulefcens, elytris rubris: fasciis tribus nigris.

Fabr. sp. inf. 1. p. 202. n. 9. *mant. inf.* 1. p. 126. n. 14.

Clerus elytris rubris: fasciis tribus caerulefcens.

Geoffr. inf. par. 1. p. 304. n. 1. t. 5. f. 4. Clerus nigro-violaceus hirsutus &c.

Degeer inf. 5. p. 157. n. 1. t. 5. f. 3. Clerus caeruleo-violaceus.

Schranck inf. austr. p. 21. n. 36. Dermestes apiarius.

Swammerd. bibl. nat. t. 26. f. 3.

Reaum. inf. 6. t. 8. f. 10.

Sulz. hist. inf. t. 4. f. 6. et 14.

Schaeff. el. t. 46.

ic. t. 48. f. 11.

Habitat in Europa, America, Sibiria, larva frequens in alveariis, imago in floribus, fornicario duplo major.

cyaneus. 30. A. cyaneus, abdomine pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 15.

Habitat in India, mediae magnitudinis.

crabroni- 31. A. niger hirtus, elytris rufis: fasciis tribus nigris; tertia formis. terminali. *Fabr. mant. inf.* 1. p. 126. n. 16.

Habitat in Oriente, apiario major.

†† *palpis quatuor subfiliformibus*, Spondylides.

ceramboi- 12. A. ater, elytris rugosis thorace latioribus. *Fr. suec.* 643.*
des. *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 2. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 2.

Uddm. diss. 26. t. 1. f. 1. Curculio maximus ater oblongus, elytris irregulariter reticulatis.

Degeer inf. 5. p. 32. n. 2. Tenebrio variolosus.

Habitat in boleto fomentario; nonne potius tenebrio?

buprestoi- 13. A. ater, elytris nervosis, thorace subgloboso. *Fr. suec.*
des. 644.* *Fabr. sp. inf.* 1. p. 203. n. 1. *mant. inf.* 1. p. 127. n. 1.

Fr.