

BULLETIN

De la

Société Impériale

des Naturalistes

DE MOSCOU,

publié par

G. Fischer de Waldheim.

TOME VIII.

accompagné de X planches.

M O S C O U.

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

1835.

COLEOPTERA QUAEDAM ROSSICA DE-
SCRIPTIONE ET ICONE ILLUSTRATA

auctore G. FISCHER DE WALDHEIM.

1. *CICINDELA descendens.*

Tab. VI. f. 1.

Entomogr. rossica. Tom. III. p. 35.

*C. profunde aeneo - viridis ; elytris parallelis,
puncto humerali , lunula apicali fasciaque me-
dia oblique descendente flavescens*

Long. $4\frac{1}{2}$ lin. Lat. 2 lin.

Descripſi hanc ſpeciem elegantem in Entomographia roſſica , l. c. ad individuum mutilatum , a Cl. ADAMS in littoribus lacus Baicalenſis lectum. Nunc Cl. BUNGE mihi exemplar completum communicavit , quod in deſertis altis Tſchujae Altaï orientalis invenit.

Forma et magnitudo *Cicindelae gracilis.*
Caput profunde aeneo viride , oculis magnis

antennisque aeneis. Thorax angustus, coloris capitis; linea media longitudinali, antica et postica transversa impressis splendentibus aeneis. Elytra opaca, scabriuscula viridia, puncto humerali, non nisi ainali a capite adspecto, adparente flavescente; fascia media obliqua conum format descendentem et in maculam subquadrata terminatur. Lunula apicalis bene expressa ab aliis non recedit. Corpus subtus coeruleo - aeneum, pedibus omnibus aeneis.

2. *CLEONUS thoracicus*

Tab. VI. f. 3.

Cl. lateritio pruinosis; capite carinato; thorace postice gibboso; elytris inaequaliter sulcatis.

Longit. 6 lin. Lat. $2\frac{1}{4}$ lin.

Caput lateritio - pruinosis, fronte tuberculis duobus, et utrinque lobata. Rostrum paullo incurvum, antice fissum, basi carina brevi ornatum. Thorax postice gibbosus, sursum et antice punctatus et brevi - carinatus. Elytra distincte trisulcata, seriebus intermediis binis punctorum impressorum, postice tuberculata, callo elevato, dense lateritio - pulve-

rulenta. Corpus subtus et pedes albo - pruinosi.

3. *CLEONUS Fronto.*

Tab. VI. f. 7.

Cl. albo - pruinosis ; fronte convexa , elevata ; thorace vittis duabus elytrisque punctato - sulcatis fasciis trinis obliquis fuscis.

Long. 3 lin. — Lat. 2 lin.

Caput fronte intumida , rostro brevi incurvo , basi vestigio carinae , albo - pruinosis , oculis fuscis conicis. Thorax albo - pruinosis , vittis duabus fuscis. Elytra sulcata , interstitiis punctatis , albopruinosa , fasciis tribus obliquis fuscis. Corpus subtus et pedes dense albo - pruinosis.

E Tataria magna. Dr. PANDER.

4. *CLEONUS Panderi.*

Tab. VI. f. 4.

Cl. dense albo pruinosis ; thorace fusco , carina angusta alba ; elytris dense albo - pruinosis , macula triangulari axillari lunulisque duabus fuscis.

Caput fuscum punctis elevatis donatum , fronte parum distincta , rostro parum incurvo

carina granulata angusta vix distinguenda. Thorax fuscus linea media angusta pruinoso - alba, medio punctis binis utrinque duplici serie. Elytra dense pruinoso - alba, maculis axillaribus triangularibus medioque lunatis duabus fuscis. Corpus subtus et pedes dense pruinoso-albi.

E Tataria magna. Dr. PANDER.

5. *CLEONUS scalaris.*

Tab. VI. f. 5.

Cl. elongatus angustus niger; vitta thoracis antice tridentata, elytrorumque suturali lata, medio oblique biemarginata albo-ferruginea.

Long. $5\frac{1}{4}$ lin. — Lat. $1\frac{1}{4}$ lin.

Caput nigrum, rostro elongato, carinato utrinque linea pruinoso - alba. Thorax niger variolosus, niger, linea media antice tridentata ferrugineo - pruinosa. Elytra seriatim punctata, nigra, fascia suturali lata, antice excisionibus obliquis, ferrugineo-alba, marginali distincte alba. Corpus subtus et pedes pruinoso-albi.

E Sibiria. Dr. PANDER.

6. *CLEONUS rubrifrons.*

Tab. VI. f. 6.

Cl. niger, fronte ceraso-rubra; thorace fasciis binis utrinque incurvis albo-pruinosis; elytris sulcatis nigris, pruina alba irregulariter adpersis.

Long. 7 lin. — Lat. 3 lin.

Caput nigrum fronte excavata, vertice rubro, rostro incurvo carinato. Thorax niger torulosus, antice carinatus, carina medio guttis duabus elevatis terminata, latere lineis binis incurvis albo-pruinosis decoratus. Elytra sulcata nigra, pruina alba irregulariter adpersa. Corpus subtus et crura nigra nitida, his macula superiore albo pruinosa; pedibus pilosis, tibiis posticis tarsisque pruinoso-albis.

Hab. Dauria. . . .
